



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 2/2563

คำหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 75-125 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 110 มม.) ภาคกลางประมาณ 65-120 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 117 มม.) ภาคตะวันออกประมาณ 130-200 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 190 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-180 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 191 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 90-150 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 148 มม.) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 125-175 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 150 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 220-335 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 284 มม.)

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 34.9°ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.2°ซ.) ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 33.4°ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.7°ซ.)

2. เดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ โดยภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ประมาณ 15-30 มม. ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยปริมาณฝนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10-20 มม. ภาคตะวันออก 15-30 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล น้อยกว่า 10 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส

3. เดือนมีนาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 15-30 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30-50 มม. ภาคกลางประมาณ 20-40 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 40-60 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 50-70 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 70-100 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20-40 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส

4. เดือนเมษายน คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 60-90 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70-100 มม. ภาคกลางประมาณ 60-90 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 80-110 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 60-90 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 140-180 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 80-110 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้ (เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553)

เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัดเข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนนี้เป็นต้นไป ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก

เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สำหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ

ข้อควรระวัง


เดือนกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศเมียนมา ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกได้

เดือนมีนาคมและเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือสวนไร่นา


ช่วงปลายเดือนเมษายน อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลน โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

คาดหมายปริมาณฝน(มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือน กุมภาพันธ์ 2563



ปริมาณฝนเดือน มีนาคม 2563




ปริมาณฝนเดือน เมษายน 2563




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน
กุมภาพันธ์ 2563



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน
มีนาคม 2563




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน
เมษายน 2563



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

ภาค		กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน
เหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	33-35	36-38	36-38
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	17-19	20-22	23-25
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-9	7-8	8-9
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-5	3-6	4-6
	ปริมาณฝน (มม.)	น้อยกว่า10	15-30	60-90
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	1-2	2-3	6-8
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-34	35-37	35-37
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	19-21	22-24	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด(ชม./วัน)	7-8	6-8	6-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	4-6	5-6
	ปริมาณฝน (มม.)	10-20	30-50	70-100
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	3-5	7-9
กลาง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	34-36	36-38	36-38
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22-24	23-25	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	8-9	7-8	8-9
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	5-7	5-7
	ปริมาณฝน (มม.)	น้อยกว่า10	20-40	60-90
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	1-2	2-3	6-8
ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-34	34-36	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	25-27
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	6-8	6-7	6-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-5	4-6	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	15-30	40-60	80-110
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	4-6	7-9
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31-33	32-34	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22-24	23-25	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-9	7-8	6-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-5	4-5	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	15-30	50-70	60-90
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	4-6	6-8
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	33-35	33-35	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22-25	23-25	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	8-9	8-9	7-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-5	5-6	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	15-30	70-100	140-180
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	6-8	12-14

ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ลมจะเริ่มเปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วงซึ่งจะทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ และในช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง และมีลมใต้พัดเข้าปกคลุมทำให้มีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนในบางพื้นที่ สำหรับสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิจะเริ่มแตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน(อุณหภูมิต่ำสุดและอุณหภูมิสูงสุด) สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย ปริมาณการระเหยของน้ำจะมากขึ้นทำให้ความชื้นในดินจะลดลง

สำหรับอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้แตกต่างกันมาก เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ และเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยและสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมืออย่างทุกครั้ง และใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะรถที่ใช้ในการเกษตรหากมีความจำเป็นต้องวิ่งบนถนนหลวงในตอนกลางคืนหรือในช่วงที่หมอกกลงจัดควรดูแลไฟหน้าและไฟท้ายให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ส่วนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างในพืชไร่ และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงในช่วงที่มีหมอกลงอาจเป็นโรคราดำได้ หากพบโรคดังกล่าว เกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยน้ำก็จะทำให้ลดการระบาดของโรคดังกล่าวลงได้

เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง โดยคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำหยด หรือให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำ เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย ส่วนผู้ที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำของพืช โดยเฉพาะพืชที่อยู่ในระยะผลิดอกออกผลจะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากที่สุด หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะผลอ่อน เช่น ลิ้นจี่ และลำไย เป็นต้น เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม เพราะหากขาดน้ำจะทำให้การติดผลลดลง ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวก

ปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆใน พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชที่ปลูก ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

เดือนมีนาคม เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน ลมที่พัดจะเป็นลมฝ่ายใต้ ท้องฟ้าโปร่งและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนกลางวัน สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย สภาพอากาศจะแห้งและร้อน การระเหยของน้ำจะมากขึ้น

ระยะนี้จะมีแสงแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน ตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เพราะจะเป็นเชื้อไฟที่ดี นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนที่มีน้อยในระยะนี้ เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง และควรให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำ รวมทั้งคลุมบริเวณโคนต้นพืชและแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ พางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืชในระยะเจริญเติบโต

อนึ่ง ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกกว่าเดิม และควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ เพราะจะทำให้สัตว์น้ำเครียดและอ่อนแอได้ง่าย

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยนำวัสดุฉนวนน้ำ ชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน หากมีน้ำเพียงพอควรฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน หรืออาจฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน รวมทั้งควรติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือน เนื่องจากน้ำที่ระเหยจะนำความร้อนออกไปด้วย ก็จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนลงได้ และหากทำได้ควรเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้าก็จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้และช่วยลดสภาวะโลกร้อน หรืออาจสร้างหลังคาโรงเรือนให้มีความลาดชันอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นสามารถไหลออกไปได้ทางด้านบน ของหลังคาได้ก็จะช่วยลดความอบอ้าวภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนี้ควรเพิ่มน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์เลี้ยงจะมีความต้องการน้ำมากกว่าปกติ และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย สำหรับในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้ เกษตรกรควรดูแลและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

เดือนเมษายน เดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ลมที่พัดจะเป็นลมฝ่ายใต้ ท้องฟ้าโปร่งและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิจะสูงขึ้น สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง การระเหยของน้ำจะมากขึ้น และในบางช่วงอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

ระยะนี้น้ำระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบไม้ และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรหมั่นตรวจสอบสภาพน้ำและปรับปรุงสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงในกระชังควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในเดือนนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยนำวัสดุฉนวนน้ำขุ่นน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน ฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน เพราะเมื่อน้ำระเหยก็จะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้อุณหภูมิลดลงได้ หรืออาจติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือน ออกแบบโรงเรือนให้อากาศร่ายสามารถลอยตัวในแนวตั้งได้สะดวก เพราะเมื่ออากาศร้อนลอยออกไปอากาศที่เย็นกว่าก็จะเข้ามาแทนที่ให้อุณหภูมิลดลงได้เช่นกัน และหากเกษตรกรจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องจ่ายลงได้และลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ควรเพิ่มน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์จะมีความต้องการน้ำมากขึ้นกว่าปกติ

เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อยและน้ำระเหยมีมากทำให้ความชื้นในดินลดลง สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้ง หรือให้น้ำในช่วงเย็นและค่ำ เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย หรือให้น้ำในระบบน้ำหยดก็จะประหยัดน้ำได้ และควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช

สำหรับบางช่วงอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะ ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้ง ขณะฟ้าคะนอง รวมทั้งเกษตรกรไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง และดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อน ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมใต้ในบางช่วง สำหรับอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นในตอนกลางวัน ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง

ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยง

เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยๆครั้ง และควรให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำเพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย และควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืช

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนกลายเป็นอัคคีภัย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรมผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

เนื่องจากฝนที่ตกมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมากทำให้น้ำในดินลดลง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนมีนาคม เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน ลมจะเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ สำหรับอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนกลางวัน ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง บางพื้นที่อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนที่จะมีอุณหภูมิสูง

ในเดือนนี้จะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และร่างกายขาดน้ำ สำหรับพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชต้นอ่อน เกษตรกรควรทำร่มเงา เพื่อลดความเข้มของแสง ป้องกันต้นพืชเหี่ยว

เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนแบคทีเรียต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้อาหารบูดเน่าเร็วขึ้น ดังนั้นควรเลือกรับประทานแต่อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยนำวัสดุฉนวนน้ำชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน ฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือจัดทำหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หรือติดพัดลมเป่าและดูดให้กับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หากทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า และควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์ต้องการน้ำมากกว่าปกติ นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วย

และสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเกษตรกร

ระยะนี้น้ำระเหยจะมีมากผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำ โดยเฉพาะบ่ออนุบาล ส่วนผู้ที่ปลูกพืช ระยะนี้จะมีปริมาณฝนน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร เนื่องจากความชื้นในดินที่ลดลงอาจส่งผลให้ต้นพืชเหี่ยวเฉา เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง บริเวณแปลงปลูกพืชและบริเวณโคนต้นพืช เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง เหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรมผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสังเกตหากพบการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัดก่อนจะระบาดไปสู่ต้นอื่นๆ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงเก็บพืชผลการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเป็นอัคคีภัย

เดือนเมษายน เดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ลมจะเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม สำหรับกลางวันจะมีอากาศร้อน ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง บางพื้นที่อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ในช่วงฤดูร้อนเชื้อโรคต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยเลือกรับประทานแต่อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหาหมมีความจำเป็นต้องจุดไฟเพื่อใช้งานควรกับให้สนิททุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเป็นอัคคีภัย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

เนื่องจากน้ำระเหยได้มากในระยะนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงในกระชังควรขยับกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกขึ้น รวมทั้งควรทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำตัวอ่อน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำร่มเงาให้กับสัตว์เลี้ยง และฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือนก็จะทำให้สัตว์สดชื่นขึ้น และควรเพิ่มน้ำกินให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์มีความต้องการน้ำมากกว่าช่วงอื่นๆ

ในช่วงที่มีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับพืชต้นอ่อนที่ปลูกในฤดูฝนที่ผ่านมา เกษตรกรควรจัดทำร่มเงา เพื่อลดความเข้มของแสง ป้องกันต้นพืชเหี่ยวเฉา

เนื่องจากระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมากทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และประหยัดน้ำ โดยอาจให้น้ำแบบน้ำหยด หรือให้น้ำพืช

ครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง หรือให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่าก็จะลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหยลงได้ รวมทั้งควบคุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น ก็จะลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย
กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

<http://www.tmd.go.th/agromet.php>

โทรศัพท์ 02-3669338


Adisorn Somwang

ออกประกาศ กุมภาพันธ์ 2563

แผนที่แสดงปริมาณฝนรวมในเดือนที่ผ่านมาและจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า 3 มม. ติดต่อกัน

ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563


TOTAL MONTHLY RAINFALL
FROM 1-31 มกราคม 2020



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT


จำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า 3 มม. ติดต่อกัน จนถึง
2 กุมภาพันธ์ 2563

NUMBER OF CONSECUTIVE DRY DAYS
UNTIL 2 กุมภาพันธ์ 2020



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)




ดัชนีความแข็งแรงของฟันที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) เป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงถึงการขาดแคลนฟันในช่วงเวลา (timescale) 2 และ 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณฟันเพียงอย่างเดียว และจำแนกเป็นระดับความรุนแรง ดังนี้


SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2	หมายถึง	ฝนชุกมากที่สุด
SPI = 1.50 ถึง 1.99	หมายถึง	ฝนชุกมาก
SPI = 1.00 ถึง 1.49	หมายถึง	ฝนชุกปานกลาง
SPI = -0.99 ถึง 0.99	หมายถึง	ฝนใกล้เคียงปกติ
SPI = -1.00 ถึง -1.49	หมายถึง	ฝนแล้งปานกลาง
SPI = -1.50 ถึง -1.99	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรง
SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรงที่สุด

ภูมิภาพพื้นที่


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์




เดือนมีนาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนมีนาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนมีนาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม




เดือนเมษายน


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนเมษายน



น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนเมษายน



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน

