



คำหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 3/2563

คำหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนประมาณ 225-305 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 277 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 255-325 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 321 มม.) ภาคกลางประมาณ 210-280 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 256 มม.) ภาคตะวันออกประมาณ 320-415 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 385 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 240-335 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 300 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 465-605 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 599 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 290-390 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 355 มม.)

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 35.3°ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.6°ซ.) ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 33.6°ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.3°ซ.)

2. เดือนมีนาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 20-30 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30-50 มม. ภาคกลางประมาณ 20-30 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 40-60 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 50-70 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 60-90 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20-30 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส

3. เดือนเมษายน คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 50-80 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60-90 มม. ภาคกลางประมาณ 50-80 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 70-110 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 60-90 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 130-170 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 60-100 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

4. เดือนพฤษภาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 160-200 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160-200 มม. ภาคกลางประมาณ 130-170 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 190-250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 120-170 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 270-350 มม.และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 200-260 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้ (เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553)

เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สำหรับในเดือนนี้โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ


เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และอาจมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขึ้นมาพัดผ่านภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยได้

ข้อควรระวัง

เดือนมีนาคมและเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือสวนไร่นาได้


ช่วงปลายเดือนเมษายนและพฤษภาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลนได้ โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

คาดหมายปริมาณฝน(มิลลิเมตร)




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

ภาค		มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
เหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	36-38	36-38	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	19-21	23-25	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	8-9	5-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-6	4-6	4-6
	ปริมาณฝน (มม.)	20-30	50-80	160-200
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	5-7	14-16
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	35-37	35-37	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22-24	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด(ชม./วัน)	6-8	6-8	5-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	5-6	4-6
	ปริมาณฝน (มม.)	30-50	60-90	160-200
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	3-5	6-8	14-16
กลาง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	36-38	36-38	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	25-27
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	8-9	6-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	5-7	5-7	5-6
	ปริมาณฝน (มม.)	20-30	50-80	130-170
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	2-3	4-6	13-15
ตะวันออกเฉียงใต้	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	34-36	34-36	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	24-26	25-27	23-25
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	6-7	6-8	4-6
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	4-5	3-5
	ปริมาณฝน (มม.)	40-60	70-110	190-250
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	3-5	6-8	15-17
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-34	33-35	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	6-8	5-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-5	4-5	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	50-70	60-90	120-170
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	3-5	5-7	13-15
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	34-36	33-35	32-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	8-9	7-8	5-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	5-6	4-5	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	60-90	130-170	270-350
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	6-8	11-13	19-21

ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

เดือนมีนาคม เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน ลมที่พัดจะเป็นลมฝ่ายใต้ ท้องฟ้าโปร่งและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนกลางวัน สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย สภาพอากาศจะแห้งและร้อน การระเหยของน้ำจะมากขึ้น

ระยะนี้จะมีแสงแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน ตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เพราะจะเป็นเชื้อไฟที่ดี นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนที่มีน้อยในระยะนี้ เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง และควรให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำ รวมทั้งคลุมบริเวณโคนต้นพืชและแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืชในระยะเจริญเติบโต

อนึ่ง ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกกว่าเดิม และควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ เพราะจะทำให้สัตว์น้ำเครียดและอ่อนแอได้ง่าย

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยนำวัสดุฉนวนน้ำ ชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน หากมีน้ำเพียงพอควรฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน หรืออาจฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน รวมทั้งควรติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือน เนื่องจากน้ำที่ระเหยจะนำความร้อนออกไปด้วย ก็จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนลงได้ และหากทำได้ควรเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้าก็จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้และช่วยลดสภาวะโลกร้อน หรืออาจสร้างหลังคาโรงเรือนให้มีความลาดชันอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นสามารถไหลออกไปได้ทางด้านบน ของหลังคาได้ก็จะช่วยลดความอบอ้าวภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนี้ควรเพิ่มน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์เลี้ยงจะมีความต้องการน้ำมากกว่าปกติ และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย สำหรับในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้ เกษตรกรควรดูแลและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

เดือนเมษายน เดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ลมที่พัดจะเป็นลมฝ่ายใต้ ท้องฟ้าโปร่งและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิจะสูงขึ้น สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง การระเหยของน้ำจะมากขึ้น และในบางช่วงอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

ระยะนี้น้ำระเหยมก เกษตรกรควรคลุมบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบไม้ และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรหมั่นตรวจสภาพน้ำและปรับปรุงสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงในกระชังควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในเดือนนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยนำวัสดุฉนวนน้ำขุ่นน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน ฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน เพราะเมื่อน้ำระเหยก็จะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้อุณหภูมิลดลงได้ หรืออาจติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือน ออกแบบโรงเรือนให้อากาศร่ายสามารถลอยตัวในแนวตั้งได้สะดวก เพราะเมื่ออากาศร้อนลอยออกไปอากาศที่เย็นกว่าก็จะเข้ามาแทนที่ให้อุณหภูมิลดลงได้เช่นกัน และหากเกษตรกรจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องจ่ายลงได้และลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ควรเพิ่มน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์จะมีความต้องการน้ำมากขึ้นกว่าปกติ

เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อยและน้ำระเหยมกทำให้ความชื้นในดินลดลง สำหรับพื้นที่ซึ่งยังคงมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้ง หรือให้น้ำในช่วงเย็นและค่ำ เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหย หรือให้น้ำในระบบน้ำหยดก็จะประหยัดน้ำได้ และควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช

สำหรับบางช่วงอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะ ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้ง ขณะฟ้าคะนอง รวมทั้งเกษตรกรไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง และดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรให้มั่นคงแข็งแรง

เดือนพฤษภาคม เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะต้นเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ลมผิวพื้นที่พัดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้พื้นที่ซึ่งเป็นด้านรับลมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น แต่สำหรับบางพื้นที่อาจมีฝนก่อนฤดูเกิดขึ้นได้ และอาจมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับบางพื้นที่อาจมีฝนตกก่อนฤดู เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการรองรับน้ำฝนแรกมาบริโภคแต่ควรนำไปใช้ทางด้านการเกษตร เพราะฝนจะชะล้างฝุ่นละอองในอากาศ และสิ่งสกปรกบนหลังคาปะปนลงมากับน้ำฝน สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนควร

จัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้ให้พร้อมรอจนมีฝนตกสม่ำเสมอหรือดินมีความชื้นเพียงพอจึงค่อยลงมือปลูก และควรจัดเตรียมแปลงปลูกให้หันหัวแปลงไปตามทิศทางลม เพื่อให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักกระบาดในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกเมื่อมีฝนตกหนัก สำหรับเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่จะนำมาปลูกควรคลุกหรือชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันโรคเชื้อราไว้ด้วย

เนื่องจากบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง และไม่ควรอยู่กลางแจ้ง และปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฟ้าคะนอง รวมทั้งควรดูแลโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง หลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น และดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้น รวมทั้งควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบตัวที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มเพื่อรักษา ป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยตลอดจนสารคัดหลั่งจากสัตว์หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันขอบบ่อและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับตีน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวนป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ หรือผลที่ร่วงหล่นเน่าเสีย กองสุมอยู่ภายในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดให้ถูกวิธีโดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ซึ่งโรคและศัตรูพืชอาจลุกลามจากกองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสู่ต้นพืชได้

ภาคใต้

เดือนมีนาคม เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน ลมจะเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ สำหรับอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนกลางวัน ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง บางพื้นที่อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระยยะครึ่งหลังของเดือนที่จะมีอุณหภูมิสูง

ในเดือนนี้จะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และร่างกายขาดน้ำ สำหรับพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชต้นอ่อน เกษตรกรควรทำร่มเงา เพื่อลดความเข้มของแสง ป้องกันต้นพืชเหี่ยว

เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนแบคทีเรียต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้อาหารบูดเน่าเร็วขึ้น ดังนั้นควรเลือกรับประทานแต่อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยนำวัสดุอุ้มน้ำชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน ฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือจัดทำหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งแนวราบและแนวตั้ง หรือติดพัดลมเป่าและดูดให้กับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หากทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า และควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์ต้องการน้ำมากกว่าปกติ นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยและสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเกษตรกร

ระยะนี้น้ำระเหยจะมีมากผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำ โดยเฉพาะบ่ออนุบาล ส่วนผู้ที่ปลูกพืช ระยะนี้จะมีปริมาณฝนน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร เนื่องจากความชื้นในดินที่ลดลงอาจส่งผลให้ต้นพืชเหี่ยวเฉา เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง บริเวณแปลงปลูกพืชและบริเวณโคนต้นพืช เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง เหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรมผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสังเกตหากพบการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัดก่อนจะระบาดไปสู่ต้นอื่นๆ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงเก็บพืชผลการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเป็นอัคคีภัย

เดือนเมษายน เดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ลมจะเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม สำหรับกลางวันจะมีอากาศร้อน ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศจะแห้ง บางพื้นที่อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ในช่วงฤดูร้อนเชื้อโรคต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยเลือกรับประทานแต่อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหาหมึกความจำเป็นต้องจุดไฟเพื่อใช้งานควรกับให้สนิททุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันไฟลุกลามเป็นอัคคีภัย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

เนื่องจากน้ำระเหยได้มากในระยะนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงในกระชังควรขยับกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำลึกขึ้น รวมทั้งควรทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำตัวอ่อน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำร่มเงาให้กับสัตว์เลี้ยง และฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือนก็จะทำให้สัตว์สดชื่นขึ้น และควรเพิ่มน้ำกินให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์มีความต้องการน้ำมากกว่าช่วงอื่นๆ

ในช่วงที่มีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับพืชต้นอ่อนที่ปลูกในฤดูฝนที่ผ่านมา เกษตรกรควรจัดทำร่มเงา เพื่อลดความเข้มของแสง ป้องกันต้นพืชเหี่ยวเฉา

เนื่องจากระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมากทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และประหยัดน้ำ โดยอาจให้น้ำแบบน้ำหยด หรือให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง หรือให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำก็จะลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหยลงได้ รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้

ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น ก็จะลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน

เดือนพฤษภาคม เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลมจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมดังกล่าวจะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น โดยในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยชุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดและตื้นเขิน ตลอดจนชุดลอกสันดอนบริเวณปากแม่น้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดหาพื้นที่สำหรับอพยพสัตว์ไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งจัดเตรียมอาหารสัตว์เอาไว้ให้พร้อม ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับลึกลงไปแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำจะเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคราสีชมพู และโรคหนักริดยางในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น โดยดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวนป้องกันโรคดังกล่าว

ส่วนในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงที่มีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


<http://www.tmd.go.th/agromet.php>

โทรศัพท์ 02-3669338


Adisorn Somwang

ออกประกาศ มีนาคม 2563

แผนที่แสดงปริมาณฝนรวมในเดือนที่ผ่านมาและจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า
3 ม.ม. ติดต่อกัน



ดัชนีความแข็งแรงของฟันที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)




ดรชนิความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) เป็นดรชนิที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงถึงการขาดแคลนฝนในช่วงเวลา (timescale) 2 และ3 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนเพียงอย่างเดียว และจำแนกเป็นระดับความรุนแรง ดังนี้


SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2	หมายถึง	ฝนชุกมากที่สุด
SPI = 1.50 ถึง 1.99	หมายถึง	ฝนชุกมาก
SPI = 1.00 ถึง 1.49	หมายถึง	ฝนชุกปานกลาง
SPI = -0.99 ถึง 0.99	หมายถึง	ฝนใกล้เคียงปกติ
SPI = -1.00 ถึง -1.49	หมายถึง	ฝนแล้งปานกลาง
SPI = -1.50 ถึง -1.99	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรง
SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรงที่สุด

เดือนมีนาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนมีนาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนมีนาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม




เดือนเมษายน


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนเมษายน




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนเมษายน



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน




เดือนพฤษภาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม



น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม

