



คำหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 3/2566

คำหมายลักษณะอากาศ

ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมทั้งทุกภาคจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยค่าปกติของ แต่ละภาคมีดังนี้ ภาคเหนือค่าปกติ 276.2 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 318.9 มิลลิเมตร ภาคกลางค่าปกติ 285.6 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกค่าปกติ 373.8 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 296.5 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่าปกติ 566.4 มิลลิเมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าปกติ 361.1 มิลลิเมตร

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยค่าปกติ ของ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยแต่ละภาคมีดังนี้ ภาคเหนือค่าปกติ 36.2 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส ภาคกลางค่าปกติ 36.3 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกค่าปกติ 34.2 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 33.5 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่าปกติ 33.8 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าปกติ 35.2 องศาเซลเซียส

ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยค่าปกติของอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยแต่ละภาคมีดังนี้ ภาคเหนือค่าปกติ 22.9 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 24.1 องศาเซลเซียส ภาคกลางค่าปกติ 25.3 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกค่าปกติ 25.7 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ 24.6 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่าปกติ 24.5 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าปกติ 26.8 องศาเซลเซียส

เดือนมีนาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ทั่วทุกภาค โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 20-40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวม 30-50 มม. ภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวม 50-80 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 60-90 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวม 80-110 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติทั่วทุกภาค โดยบริเวณ ภาคเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส

เดือนเมษายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน้อยกว่า ค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคอื่นๆ ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 50-80 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 60-90 มม. ภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวม 80-110 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวม 140-180 มม. ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวม 70-100 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติทั่วทุกภาค โดยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-36 องศาเซลเซียส

เดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ทั่วทุกภาค โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 170 - 210 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวม 180 - 220 มม. ภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวม 160 - 200 มม. ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวม 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวม 120 - 160 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวม 300 - 350 มม. ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวม 210-250 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติทั่วทุกภาค โดยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้ (เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2534-2563)

เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน ที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อน มักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรง ถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สำหรับในเดือนนี้โดยทั่วไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนและในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้อาจมีพายุ

ไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ ทางด้านตะวันตกของประเทศได้


ข้อควรระวัง

เดือนมีนาคมและเมษายน มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ช่วงปลายเดือนเมษายนและพฤษภาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลน โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น


เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

คำทหายปริมาณฝน(มิลลิเมตร)




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คำทหายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝนและจำนวนวันฝนตก

ภาค		มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
เหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	35-37	36-38	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	21-23	23-25	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	8-9	5-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-6	4-6	4-6
	ปริมาณฝน (มม.)	20-40	50-80	170-210
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	3-5	3-4	14-17
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	34-36	35-37	34-36
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22-24	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	6-8	6-8	5-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	5-6	4-6
	ปริมาณฝน (มม.)	30-50	60-90	180-220
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	4-6	4-6	14-17
กลาง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	35-37	36-38	35-37
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	24-26	25-27	25-27
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	8-9	6-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	5-7	5-7	5-6
	ปริมาณฝน (มม.)	30-50	60-90	160-200
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	3-5	4-6	13-16
ตะวันออกเฉียงใต้	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	33-35	34-36	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	24-26	25-27	25-27
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	6-7	6-8	4-6
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-6	4-5	3-5
	ปริมาณฝน (มม.)	50-80	80-110	200-250
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	5-7	5-7	14-17

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝนและจำนวนวันฝนตก

ภาค		มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-34	33-35	33-35
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	7-8	6-8	5-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-5	4-5	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	60-90	60-90	120-160
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	5-7	5-7	13-16
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	33-35	33-35	32-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	8-9	7-8	5-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	5-6	4-5	4-5
	ปริมาณฝน (มม.)	80-110	140-18	300-350
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	8-10	8-10	18-21

ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

เดือนมีนาคม เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือน อากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก กับจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวเย็น สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศแห้ง สมดุลน้ำจะมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่ อนึ่ง ในบางช่วงอาจมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน

สำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนบางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา

ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ และวางแผนการใช้น้ำเหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง รวมทั้งควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องติดไฟ ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเป็นอัคคีภัย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

สำหรับอากาศที่ร้อนทำให้น้ำระเหยได้มาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงและดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยอาจติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น หรืออาจฉีบน้ำบริเวณหลังคาเพื่อลดความร้อนบริเวณหลังคา หรืออาจฉีบน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หากมีน้ำน้อยอาจนำวัสดุอุ้มน้ำซึมน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน เพราะเมื่อน้ำระเหยจะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบข้างลดลงได้ หากทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะลดค่าไฟฟ้าลงได้และเป็นพลังงานสะอาด รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน สัตว์เลี้ยงมีความต้องการน้ำมากกว่าปกติ

อนึ่ง ในบางช่วงอาจเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งเป็นเวลานานๆ หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียมและควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับพืชที่ปลูกใหม่ควรทำที่พรางแสง เพื่อลดความเข้มของแสงและลดอุณหภูมิป้องกันต้นพืชเหี่ยวเฉา

เดือนเมษายน เดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ลมฝ่ายใต้จะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย สภาพอากาศแห้ง สมดุลน้ำจะมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่ สำหรับภาคใต้จะมีอากาศไม่ร้อนมาก เนื่องจากมีทะเลขนานทั้งสองด้าน อนึ่ง ในบางช่วงอาจมีพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

ระยะนี้จะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้ และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ รวมทั้งควรใส่แว่นกันแดดเพื่อถนอมรักษาดวงตา ส่วนพืชที่ปลูกใหม่หรือพืชต้นอ่อนควรทำที่พรางแสงเพื่อลดความเข้มของแสงและลดอุณหภูมิป้องกันต้นพืชเหี่ยวเฉา

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมากในระยะนี้ประกอบกับปริมาณฝนที่มีน้อย เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน และควรใช้ที่มีอยู่อย่างประหยัด โดยให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใช้ระบบน้ำหยด ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงและดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนอุณหภูมิที่สูงในระยะนี้ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หากมีน้ำเพียงพออาจฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หากมีน้ำน้อยอาจนำวัสดุอุ้มน้ำชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน เมื่อน้ำระเหยจะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้บริเวณรอบข้างมีอุณหภูมิลดลง หากทำได้ควรเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะลดค่าไฟฟ้าลงได้และเป็นพลังงานสะอาด รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์มีความต้องการน้ำมากกว่าปกติ

อนึ่ง ในเดือนนี้บางพื้นที่อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฟ้าคะนอง รวมทั้งไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง นอกจากนี้ควรผูกยึดและย้ายนกขี้และลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยมีฝนตกสลับกับสภาพอากาศร้อนเป็นช่วงๆ ลมที่พัดเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ บางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในระยะครึ่งแรกของเดือนกลางวันจะมีอากาศร้อน สภาพอากาศจะแห้ง แดดจัด

ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อัตราการระเหยของน้ำจะมีมาก สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่ ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น อัตราการระเหยของน้ำจะลดลง สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบน้อยลงโดยส่วนใหญ่

เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับบางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ ควรเตรียมดินเอาไว้ให้พร้อม เมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอและดินมีความชื้นเพียงพอจึงค่อยลงมือปลูก โดยจัดเตรียมแปลงปลูกให้หันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลม เพื่อให้ลมพัดผ่านได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในแปลงปลูกพืชโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุก

สำหรับในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม ส่วนพื้นที่ซึ่งยังคงมีสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้ แต่การระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวจะลดลงเมื่อมีฝนตก สำหรับฝนที่ตกในระยะแรก เกษตรกรควรหลีกเลี่ยง การรองรับน้ำฝนแรกมาบริโภคแต่ควรนำไปใช้ทางการเกษตร เนื่องจากฝนจะชะล้างฝุ่นละอองและ สิ่งสกปรกในอากาศและบนหลังคาปะปนลงมากับน้ำฝน

ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร และโคนต้นพืชนานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม และแผงกั้นฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น และในบางช่วงจะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยจัดเตรียม อุปกรณ์สำหรับสูบน้ำ และจัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงตลอดจนเตรียมอาหารและน้ำกินสำหรับสัตว์เอาไว้ให้พร้อม ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

ภาคใต้

เดือนมีนาคม เป็นช่วงต้นฤดูร้อน อุณหภูมิกลางวันจะสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน สภาพอากาศจะแห้ง แดดจัด ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อัตราการระเหยของน้ำจะเพิ่มขึ้น สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่

เดือนนี้สภาพอากาศจะแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงและดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศในแนวตั้งเพื่อให้อากาศร้อนเคลื่อนตัวขึ้นข้างบนได้ดี หรือติดตั้งพัดลมเป่าและดูดในแนวนอนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น หรืออาจฉีดน้ำบริเวณหลังคาเพื่อลดความร้อนบริเวณหลังคา หรืออาจฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หากมีน้ำน้อยอาจนำวัสดุอุ้มน้ำซึบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน เพราะเมื่อน้ำระเหยจะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบข้างลดลงได้ หากทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะลดค่าไฟฟ้าลงได้และเป็นพลังงานสะอาด รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน สัตว์เลี้ยงมีความต้องการน้ำมากกว่าปกติ

อนึ่ง ระยะนี้จะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียมและควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

เดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูร้อน ลมที่พัดส่วนใหญ่จะเป็นลมฝ่ายใต้ อุณหภูมิกลางวันจะสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนและอาจมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ สภาพอากาศจะแห้ง แดดจัด ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อัตราการระเหยของน้ำจะเพิ่มขึ้น สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง ตลอดจนดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน ช่วงนี้ปริมาณฝนมีน้อยทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกร ควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพก็จะช่วยประหยัดน้ำได้

ส่วนสภาพอากาศที่ร้อน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยอาจติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อส่งอากาศร้อนขึ้นข้างบนและดูดอากาศที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่ ถ้าทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ หากมีน้ำมากพออาจฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หากน้ำมีน้อยอาจนำวัสดุอุ้มน้ำขุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน เมื่อน้ำระเหยก็จะนำเอาความร้อนส่วนหนึ่งออกไปด้วยทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบข้างลดลง นอกจากนี้ควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์เลี้ยงจะมีความต้องการน้ำมาก หากทำได้ควรอาบน้ำให้กับสัตว์ก็จะช่วยให้สัตว์คลายเครียดและให้ผลผลิตจากสัตว์ที่สูงขึ้น สำหรับระยะนี้จะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง เป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียมและควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

อนึ่ง ในเดือนต่อไปจะเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน สำหรับในช่วงเปลี่ยนฤดูอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และอาคารบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรุ่นใหม่ในช่วงฤดูฝนควรเตรียมดินไว้ให้พร้อมและตากดินไว้ก่อน เมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอและดินมีความชื้นเพียงพอก็จะสามารถลงมือปลูกพืชได้ หากทำได้ควรหันหัวแปลงปลูกตามทิศทางลม เพื่อให้ลมพัดผ่านแปลงปลูกได้สะดวก ซึ่งจะลดความชื้นสะสมภายในพื้นที่การเกษตร เมื่อมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลมที่พัดส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากลมฝ่ายใต้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ สำหรับในระยะครึ่งแรกของเดือนอุณหภูมิกลางวันจะสูงในบางพื้นที่ อากาศร้อน สภาพอากาศจะแห้ง แดดจัด ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อัตราการระเหยของน้ำจะมีมาก โดยจะมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบน้อยกว่าครึ่งแรกของเดือน

สำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนบางพื้นที่อาจมีฝนตก เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการรองรับน้ำฝนแรกมาบริโภค แต่ควรนำไปใช้ทางการเกษตรแทน เนื่องจากฝนจะชะล้างฝุ่นละอองในอากาศและสิ่งสกปรกบนหลังคาปะปนลงมากับน้ำฝน นอกจากนี้เกษตรกรควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้รั่วซึมและแผงกำบังฝนขาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและ

เป็นโรคได้ง่าย สำหรับบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกัน ความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะฟ้าคะนอง และไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ควรเตรียมดินเอาไว้ให้พร้อม เมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอหรือดินมีความชื้นเพียงพอก็สามารถลงมือปลูกพืชได้ หากทำได้ควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลมเพื่อให้ลมพัดผ่านได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักจะเกิดในฤดูฝนซึ่งมีความชื้นในดินและในอากาศสูง ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก และขุดลอกคูคลองให้น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชเป็นเวลานานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดหา และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงหากเกิดสภาวะน้ำท่วม รวมทั้งจัดเตรียมอาหารสัตว์และน้ำกินสำหรับสัตว์ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลัง แรงขึ้น เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัดเรือเล็กควรงด ออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

<http://www.tmd.go.th/agromet.php>


Adisorn Somwang

ออกประกาศ มีนาคม 2566


แผนที่แสดงปริมาณฝนรวม และปริมาณฝนรวมที่ต่างจากค่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566



แผนที่แสดงปริมาณฝนรวมในเดือนที่ผ่านมาและจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า
3 ม.ม. ติดต่อกัน



ดรชนีความแข็งแกร่งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)




๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.


SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2	หมายถึง	ฝนชุกมากที่สุด
SPI = 1.50 ถึง 1.99	หมายถึง	ฝนชุกมาก
SPI = 1.00 ถึง 1.49	หมายถึง	ฝนชุกปานกลาง
SPI = -0.99 ถึง 0.99	หมายถึง	ฝนใกล้เคียงปกติ
SPI = -1.00 ถึง -1.49	หมายถึง	ฝนแล้งปานกลาง
SPI = -1.50 ถึง -1.99	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรง
SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรงที่สุด

เดือนมีนาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนมีนาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนมีนาคม




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม




อุณหภูมิดินเดือนมีนาคม




เดือนเมษายน


ปริมาณฝนเฉลี่ยเดือนเมษายน




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนเมษายน



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนเมษายน




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนเมษายน




อุณหภูมิดินเดือนเมษายน


อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่0ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่5ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่10ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่20ซม.



อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่50ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่100ซม.




เดือนพฤษภาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม




อุณหภูมิดินเดือนพฤษภาคม


อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่0ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่5ซม.




อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่10ซม.



อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่20ซม.



อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่50ซม.



อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่100ซม.

