



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## คาดหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 6/2563

### คาดหมายลักษณะอากาศ

**1. ในระยะ 3 เดือนนี้** คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 480-590 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 550 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 600-730 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 701 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 410-500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 452 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 480-590 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 536 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 760-930 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 841 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 315-405 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 358 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 910-1,100 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,047 มม.)

ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 33-35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.7 °ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 25-27 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.8 °ซ.)

**2. เดือนมิถุนายน** คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 140-190 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160-210 มม. ภาคกลางประมาณ 120-160 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 220-290 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 250-320 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 140-190 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 -1 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

**3. เดือนกรกฎาคม** คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 130-180 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 170-220 มม. ภาคกลางประมาณ 130-180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240-310 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 280-360 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 150-200 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

**4. เดือนสิงหาคม** คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 200-260 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 240-310 มม. ภาคกลางประมาณ 150-200 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 250-320 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 340-440 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 170-220 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

**ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้** (เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553)

**เดือนมิถุนายน** ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย กับร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย จากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศ

**เดือนกรกฎาคม** ระยะครึ่งแรกของเดือน มักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวัน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ

**เดือนสิงหาคม** ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ


### **ข้อควรระวัง**

**เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม** มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

**ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม** มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน


**เดือนสิงหาคม** มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ เกษตรกรควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

### คาดหมายปริมาณฝน(มิลลิเมตร)




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย  
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

| ภาค                    |                                   | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|
| เหนือ                  | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35    | 32-34   | 32-34   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26    | 23-25   | 23-25   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 4-6      | 3-5     | 3-4     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 4-6      | 3-5     | 3-5     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 140-190  | 130-180 | 200-260 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 17-19    | 19-21   | 20-22   |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ     | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35    | 33-35   | 32-34   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 25-27    | 24-26   | 24-26   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด(ชม./วัน)  | 4-7      | 3-6     | 3-6     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 4-6      | 4-6     | 3-6     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 160-210  | 170-220 | 240-310 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 15-17    | 17-19   | 19-21   |
| กลาง                   | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 34-36    | 33-35   | 33-35   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 25-27    | 24-26   | 24-26   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 5-7      | 4-5     | 4-5     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 4-5      | 4-5     | 4-5     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 120-160  | 130-180 | 150-200 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 15-17    | 16-18   | 18-20   |
| ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35    | 32-34   | 32-34   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 25-27    | 25-27   | 25-27   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-5      | 3-5     | 3-4     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-5      | 3-5     | 3-4     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 220-290  | 240-310 | 250-320 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 16-18    | 17-19   | 18-20   |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันออก     | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35    | 32-34   | 32-34   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26    | 24-26   | 24-26   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 4-6      | 4-6     | 3-6     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-4      | 3-4     | 3-4     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 100-140  | 100-140 | 100-140 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 13-15    | 14-16   | 15-17   |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันตก      | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 32-34    | 31-33   | 31-33   |
|                        | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26    | 24-26   | 24-26   |
|                        | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-5      | 4-5     | 4-5     |
|                        | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-5      | 3-4     | 3-4     |
|                        | ปริมาณฝน (มม.)                    | 250-320  | 280-360 | 340-440 |
|                        | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 17-19    | 19-21   | 20-22   |

## ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

**เดือนมิถุนายน** เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศ ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ สำหรับในระยะปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง

สำหรับบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยชุดลอกทางระบายน้ำอย่าให้ตันขึ้น น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเตรียมพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยงตลอดจนอาหารสัตว์ไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง หากเกษตรกรต้องอพยพไปด้วยควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้พร้อม รวมทั้งจัดเตรียมระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้ด้วย และควรศึกษาทิศทางการไหลของน้ำที่เข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในการอพยพสัตว์เลี้ยง

ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น โดยดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในแปลงปลูก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกไม่อับชื้น หลังคาไม่รั่วซึม และจัดทำแผงก้างฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนและหนาวเย็น รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งมีระบาดในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ ริน ไร เป็นต้น มารบกวนสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยงได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตก เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ นอกจากนี้ควรเตรียมวัสดุสำหรับกันบอบบ่อ และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเกษตรอย่าให้ชำรุดเสียหายจนเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัดเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง และควรระวังป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ สำหรับพืชที่ปลูกไปแล้ว เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้

**เดือนกรกฎาคม** เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดือนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยจะมีกำลังอ่อน ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น

สำหรับในระยะครึ่งแรกของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก เป็นต้น หากขาดน้ำจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

ส่วนในช่วงครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำในช่วงที่มีน้ำท่วม โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยเข้ามาแพร่พันธุ์ในแปลงนาและกัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู นอกจากนี้ควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งจัดเตรียมอาหารสัตว์ ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืน เอาไว้ให้พร้อม ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรกันขอบบ่อให้สูงขึ้นและจัดเตรียมวัสดุสำหรับกั้นน้ำและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

ในช่วงฤดูฝนแมลงศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน ไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูนี้ แมลงต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรติดตั้งดวงไฟล่อแมลงเหนือบ่อเลี้ยง เพื่อให้แมลงตัวเต็มวัยมาเล่นแสงไฟในตอนกลางคืนและตกลงไปในบ่อ เป็นอาหารเสริมของสัตว์น้ำได้ หากใช้หลอดไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้

สำหรับสภาพอากาศที่ขึ้นบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ขึ้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูฝนให้กับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ หลังคาไม่รั่วซึม และแผงกันฝนสาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ เนื่องจากช่วงฤดูฝนดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณพื้นที่เพาะปลูกและโคนของต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนสิงหาคม** เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยจะมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงหรือร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

ในช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยอพยพสัตว์เลี้ยง รวมทั้งอาหารสัตว์ไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง ส่วนชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ ซึ่งลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยเข้ามาในแปลงนาแล้วแพร่พันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป และควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้

ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าวนาปี โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น โดยดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น รวมทั้งควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาไม่รั่วซึม แผงกำบังฝนสาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น หนาวเย็น รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยงเพราะจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยงได้ นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเสริมคันดินบริเวณขอบบ่อ เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายและหลังจากฝนตก เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้ำแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ สำหรับในช่วงฤดูฝน แมลงต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรติดตั้งดวงไฟเหนือขอบบ่อเพื่อล่อแมลงตัวเต็มวัยให้มาเล่นแสงไฟในตอนกลางคืนและตกลงไปในบ่อเป็นอาหารเสริมของสัตว์น้ำได้หากทำได้ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้

ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

## **ภาคใต้**

**เดือนมิถุนายน** เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมดังกล่าวจะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น โดยในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่

ในช่วงที่มีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกเป็นเวลานานส่งผลให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตก เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ

ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคราสีชมพู และโรคหนังกิตยาง ในยางพารา และโรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น โดยดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูก ลดการระบาดของความรุนแรงของโรคดังกล่าว ส่วนผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงที่มีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สำหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก โดยจะมีฝนในช่วงบ่ายและค่ำ โดยฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนกลางของภาค สำหรับทางตอนบนและตอนล่างของภาคจะมีฝนน้อย เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผัก และควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชไร่ และพืชผัก ตลอดจนพืชที่ปลูกใหม่ เป็นต้น

**เดือนกรกฎาคม** เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งที่พัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งแรกของเดือน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ส่วนในระยะครึ่งหลัง มรสุมดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น

ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ รวมทั้งควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชไร่ และพืชผัก เป็นต้น อย่างพอเพียง เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต

สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้จะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยขุดลอกคูคลอง และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรอย่าให้ต้นเขิน เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือน

ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวนและพืชผัก โดยเฉพาะโรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคหนักริดยางและโรคราสีชมพู ในยางพารา เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรเสริมขอบบ่อให้สูงขึ้น และจัดเตรียมวัสดุสำหรับกั้นขอบบ่อ และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณและการกระจายน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก โดยจะมีฝนในช่วงบ่ายและค่ำเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชและขยายพันธุ์พืชควรทำในระยะนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำในดินมีเหมาะสมพืชจะเจริญเติบโตได้ดี

ส่วนในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงที่มีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนสิงหาคม** เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้จะมีกำลังแรงเป็นระลอก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าว

ในช่วงที่มีฝนตกหนักเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจาก สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งโดยอพยพสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์ไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงและดูแลดูแลคลองรวมทั้งทางระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก


สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในกาแพ โรคหนักริดยาง โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า และโรคราสีชมพูในยางพารา เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรกองสุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสียกองอยู่ในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมีระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง

ส่วนในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงที่มีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
<http://www.tmd.go.th/agromet.php>  
โทรศัพท์ 02-3669338  
Adisorn Somwang

ออกประกาศ มิถุนายน 2563

แผนที่แสดงปริมาณฝนรวมในเดือนที่ผ่านมาและจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า 3 ม.ม. ติดต่อกัน



ดรชนีความแข็งแรงของฟันที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)




๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.


|                            |         |                    |
|----------------------------|---------|--------------------|
| SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2   | หมายถึง | ฝนชุกมากที่สุด     |
| SPI = 1.50 ถึง 1.99        | หมายถึง | ฝนชุกมาก           |
| SPI = 1.00 ถึง 1.49        | หมายถึง | ฝนชุกปานกลาง       |
| SPI = -0.99 ถึง 0.99       | หมายถึง | ฝนใกล้เคียงปกติ    |
| SPI = -1.00 ถึง -1.49      | หมายถึง | ฝนแล้งปานกลาง      |
| SPI = -1.50 ถึง -1.99      | หมายถึง | ฝนแล้งรุนแรง       |
| SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2 | หมายถึง | ฝนแล้งรุนแรงที่สุด |

## เดือนมิถุนายน


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนมิถุนายน




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนมิถุนายน



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน




## เดือนกรกฎาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม




## เดือนสิงหาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม



น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนสิงหาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม

