



คำหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน

ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 8/2562

คำหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 495-595 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 578 มม.) ภาคตะวันออกประมาณ 740-885 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 858 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 450-560 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 528 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 1020-1240 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1189 มม.) ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 675-790 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 768 มม.) ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือประมาณ 510-620 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 565 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 570-695 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 632 มม.)

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.3 °ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.2°ซ.)

2. เดือนสิงหาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณ ภาคเหนือ จะสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 210-280 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250-330 มม. ภาคกลางประมาณ 140-190 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 250-330 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 350-490 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 160-240 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณจะสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

3. เดือนกันยายน คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 190-260 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 220-300 มม. ภาคกลางประมาณ 200-280 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 280-380 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 120-170 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 340-460 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 290-350 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ ยกเว้น ภาคเหนือจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส

4. เดือนตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 80-140 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70-130 มม. ภาคกลางประมาณ 120-180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 170-240 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 190-270 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 290-370 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 190-260 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้(เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553)

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศ


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกของประเทศ และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

ข้อควรระวัง

เดือนสิงหาคมและกันยายน อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่


เดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวน และเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือผ่านภาคใต้ ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

คาดการณ์ปริมาณฝน(มิลลิเมตร)




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

ภาค		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
เหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31-33	32-34	32-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	23-25	22-24
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	3-4	4-6	6-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-5	3-4	3-4
	ปริมาณฝน (มม.)	210-280	190-260	80-140
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	20-23	16-19	10-13
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31-33	31-33	31-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	23-25	22-24
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด(ชม./วัน)	3-6	3-6	5-8
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-6	3-5	3-5
	ปริมาณฝน (มม.)	250-330	220-300	70-130
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	18-21	16-19	8-11
กลาง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-35	33-35	32-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	24-26	24-26	23-25
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	4-5	5-6	5-7
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	4-5	4-5	3-4
	ปริมาณฝน (มม.)	140-190	200-280	120-180
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	17-20	18-21	12-15
ตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่ง	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31-33	31-34	32-34
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	25-27	24-26	24-26
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	3-4	3-4	5-6
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-4	3-4	3-4
	ปริมาณฝน (มม.)	250-330	280-380	170-240
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	17-20	18-21	14-17

**คาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก**

ภาค		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32-35	32-34	31-33
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23-25	23-25	23-25
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	3-6	4-6	4-5
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-4	3-4	3-4
	ปริมาณฝน (มม.)	100-150	120-170	190-270
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	14-16	16-19	16-19
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31-33	31-33	31-33
	อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	24-26	23-25	23-25
	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน)	4-5	4-5	4-5
	ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)	3-4	3-4	3-4
	ปริมาณฝน (มม.)	350-490	340-460	290-370
	จำนวนวันฝนตก (วัน)	18-22	21-24	21-24

ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

เดือนสิงหาคม เดือนนี้เป็นช่วงฤดูฝน ร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศจีนตอนล่างจะเลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น อาจเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้ รวมทั้งดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น หลังคายุ้งให้มียารั่วซึม แผงกำบังฝนسادอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรระวังและป้องกันสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น ที่อาจเข้ามาหลบฝนในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงหรืออาจทำให้สัตว์ตื่น ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หากพบสัตว์มีพิสดังกล่าวควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือนโดยเร็ว นอกจากนี้หากเกิดสภาวะน้ำท่วม เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเอาไว้เพื่ออพยพสัตว์เลี้ยง รวมทั้งควรศึกษาประวัติพื้นที่ที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ว่าน้ำไหลเข้ามาจากทางทิศใด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการอพยพสัตว์เลี้ยงในยามฉุกเฉิน รวมทั้งควรจัดเตรียมอาหารและน้ำกินสำหรับสัตว์เอาไว้ให้พร้อม และระบบไฟส่องสว่างยามค่ำคืน สำหรับในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์ต่างๆ เช่น ยุง เหลือบ รินไร จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลสภาพคูคลองและทางระบายน้ำให้ใช้ได้ตามปกติ เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืช

ที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในพื้นที่เพาะปลูก ลดการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรค นอกจากนี้ไม่ควรกองมูลสัตว์สดเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ และผลที่เน่าเสียร่วงหล่นไว้ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของโรคและศัตรูพืช สำหรับในช่วงฤดูฝนพืชต่าง ๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารจากพืชที่ปลูกและวัชพืชบางชนิดยังเป็นที่อาศัยและหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช ดังนั้นการกำจัดวัชพืชจึงเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืชบางชนิดลงได้

ระยะนี้บางพื้นที่อาจมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอร์รี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านา แล้วจับหอยไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยดังกล่าวเข้ามาแพร่พันธุ์ในแปลงนาและกัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ๆ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับในช่วงฤดูฝนแมลงต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรติดตั้งดวงไฟเหนือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดไฟในตอนกลางคืนเพื่อล่อให้แมลงตัวเต็มวัยมาเล่นแสงไฟและตกลงไปในบ่อเลี้ยง เป็นอาหารเสริมของสัตว์น้ำได้

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนกันยายน เดือนนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาผาดผ่านประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเป็นช่วงๆ ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับชาวนาควรระวังและป้องกันหอยเชอร์รี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำน้ำไหลเข้านา และจับหอยไปทำลาย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ โดยเสริมคันดินกันขอบบ่อ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกใหม่ๆ เพื่อให้ น้ำรวมตัวกันและเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น รวมทั้งควรหมั่นสังเกตบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง หนีน้ำเข้ามาอาศัยในบริเวณโรงเรือนและอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยง หรืออาจทำให้สัตว์ตื่นได้ ดังนั้นหากพบสัตว์มีพิษดังกล่าวควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือนโดยเร็ว รวมทั้งจัดเตรียมที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเอาไว้พอสัตว์เลี้ยงหากเกิดสภาวะน้ำท่วม แต่ควรศึกษาประวัติพื้นที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ว่ามาจากทางทิศใด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะอพยพสัตว์เลี้ยง

ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น เช่น โรคแสดในอ้อย โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเน่าและในผักตระกูลกะหล่ำ และโรคไหม้ในข้าวนาปี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้พืชเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกหากพบโรคดังกล่าวควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคลุกลามไปยังต้นอื่นๆ ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ต้นเขินติดขัด น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกและบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

สำหรับภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนที่จะมาถึง ซึ่งจะมีฝนตกน้อย รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน และยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้ และหลังจากหมดฝน เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งไม้ผล แล้วทาแผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา โดยตัดกิ่งกระโดง กิ่งน้ำค้าง และกิ่งที่มีโรคและแมลงเข้าทำลาย แล้วนำไปกำจัดโดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนตุลาคม เดือนนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนล่างของประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปริมาณมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน ลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก วัชพืชต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งแล้วทาแผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา โดยตัดกิ่งกระโดง กิ่งน้ำค้าง รวมทั้งกิ่งที่มีโรคและแมลงทำลาย เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืชที่ปลูกและไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช แล้วเก็บรวบรวมกำจัดให้ถูกวิธีโดยเผาหรือฝังให้ลึก

สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนลมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับกันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อม และจัดทำแผงกำบังลมหนาวเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้ลมหนาวโกรกรังเรื้อนเลี้ยงสัตว์ จนสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะเริ่มลดลง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนล่างของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและเกิดสภาพน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรเสริมขอบบ่อ เพื่อไม่ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ๆ ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก โดยดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ลดการระบาดของโรคและลดความรุนแรงของโรค

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ภาคใต้

เดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมรสุมดังกล่าวจะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้ โดยทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยสำรวจคูคลองและทางระบายน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่ตื้นเขินหรือติดขัด เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้บ่อฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันสัตว์ที่จะมารบกวนสัตว์น้ำที่เลี้ยง เช่น งู และตะกวด เป็นต้น ที่อาจแอบเข้ามาในบ่อเลี้ยงและกัดกินสัตว์น้ำที่เลี้ยงหรืออาจทำให้สัตว์ตื่น ดังนั้นจึงควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ดังกล่าวควรรีบจัดการให้ออกไปจากบ่อเลี้ยงโดยเร็ว

ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคหนังกีรติยาง และโรคราสีชมพู ในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น เกษตรกรจึงควรดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูกป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับในช่วงฤดูฝนพืชต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช เนื่องจากโรคและศัตรูพืชบางชนิดสามารถอาศัยวัชพืชเจริญเติบโตได้ในบางช่วงชีวิต ส่วนพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในพื้นที่เพาะปลูก และบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

สำหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก กับจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีฝนในช่วงบ่ายและค่ำ ซึ่งจะเป็นผลดีกับพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตและเจริญเติบโตทางผล แต่ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆไว้ด้วย ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาสู่ภาคใต้ โดยทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ตันเขินติดขัด น้ำสามารถระบายได้สะดวก ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ๆ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อให้น้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคหนักริตยาง และโรคราสีชมพู และโรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น เกษตรกรควรดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่เพาะปลูกป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งควรเก็บกวาดส่วนของพืชที่เป็นโรคไปทำลาย โดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ ซึ่งมีน้ำท่วม เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง และน้ำกัดเท้า และหากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ และควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


เดือนตุลาคม เดือนนี้ทางภาคใต้จะเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนทำให้ปริมาณฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝน กับฝนตกหนักได้บางพื้นที่ เนื่องจากยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบางช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยควรขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ ตลอดจนสันดอนปากแม่น้ำอย่าให้ตื้นเขิน น้ำระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคหน่อกีรติยาง และโรคราสีชมพูในยางพารา เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ๆ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย


ส่วนในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง คลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้น ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะอากาศควรติดต่อสอบถามจากกรมอุตุนิยมวิทยา

อนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะตอนกลางและตอนล่าง ระยะต่อไปจะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรจัดเตรียมลอกคูคลองและทางระบายน้ำตลอดจนขุดสันดอนปากแม่น้ำอย่าให้ตื้นเขิน น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะในช่วงที่ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวสวนผลไม้ควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง และไม่ควรกองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ที่เป็นโรคและศัตรูพืชทำลาย ตลอดจนเปลือกผลไม้และผลไม้ที่เน่าเสีย ไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งอาจลุกลามจากกองวัสดุเหลือใช้ที่หมักหมมมาสู่ต้นพืชได้ ในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูง

แผนที่แสดงปริมาณฝนรวมในเดือนที่ผ่านมา และจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า
3 ม.ม. ติดต่อกัน



ดัชนีความแข็งแรงของฟันที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)




๓) ครรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) เป็นครรชนีที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงถึงการขาดแคลน
 ฝนในช่วงเวลา (timescale) 2 และ 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนเพียงอย่างเดียว และจำแนกเป็นระดับความ
 รุนแรง ดังนี้


SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2	หมายถึง	ฝนชุกมากที่สุด
SPI = 1.50 ถึง 1.99	หมายถึง	ฝนชุกมาก
SPI = 1.00 ถึง 1.49	หมายถึง	ฝนชุกปานกลาง
SPI = -0.99 ถึง 0.99	หมายถึง	ฝนใกล้เคียงปกติ
SPI = -1.00 ถึง -1.49	หมายถึง	ฝนแล้งปานกลาง
SPI = -1.50 ถึง -1.99	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรง
SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2	หมายถึง	ฝนแล้งรุนแรงที่สุด

เดือนสิงหาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนสิงหาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




เดือนกันยายน


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนกันยายน




อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกันยายน



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน




เดือนตุลาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนตุลาคม



น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนตุลาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม

