



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

ตุลาคม 2568

Agrometeorological Report

October 2025

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๒๓-๒๕๖๘

Weather Report No. 551.586-23-2025

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร

ตุลาคม 2568

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา

กรมอตุณียมวิทยา

กระทรวงดีจิทัตเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

พฤศจิกายน 2568

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนตุลาคม 2568	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนตุลาคม 2568	4
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนตุลาคม 2568	15
4. แหล่งข้อมูล	20

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนตุลาคม 2568	7
--	---

สารบัญรูป


รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “แมตโม (MATMO, 2521)”	1
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568	6
รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนตุลาคม 2568	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนตุลาคม 2568	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนตุลาคม 2568	13
รูปที่ 11 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2568

สภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ในระยะครึ่งแรกของเดือน มีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย และร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบางช่วง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงกับมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สำหรับสภาวะอากาศเดือนตุลาคมปีนี้ ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในระยะครึ่งแรกของเดือน นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “แมตโม (MATMO, 2521)” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นเดือน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 8-14 ตุลาคม 2568 และมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2568 ส่วนในช่วงปลายเดือนร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง และมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ อีกระบบความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน อีกทั้งลมฝ่ายตะวันออกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงปลายเดือน ทำให้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาคและปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 9 โดยอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้



รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “แมตโม (MATMO, 2521)”

วันที่ 1-10 ตุลาคม 2568 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตลอดช่วง นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “แมตโม (MATMO, 2521)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในวันที่ 5 ตุลาคม 2568 แล้วเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ย จากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งอีกครั้งบริเวณมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของประเทศจีน พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 โดยเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณเมืองหล่งเจิน ประเทศเวียดนามตอนบน แล้วอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงเช้ามีตของวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 143.1 มิลลิเมตร ที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นและปลายช่วง ส่วนกลางช่วงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 125.6 มิลลิเมตร ที่ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568

วันที่ 11-20 ตุลาคม 2568 : ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย นอกจากนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2568 ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 140.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัด พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และฉะเชิงเทรา ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 201.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

วันที่ 21-31 ตุลาคม 2568 : บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยมีกำลังปานกลางในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนและอุณหภูมิลดลง ยกเว้นในระยะปลายช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง กับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 87.2 มิลลิเมตร ที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 โดยยังคงมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 50-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และตกหนักมาก บางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 113.6 มิลลิเมตร ที่ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568


อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 อุณหภูมิต่ำที่สุด 17.0 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรเชิงทราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 7.8 มิลลิเมตร (ร้อยละ 7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 19) ภาคกลาง 26.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 14) ภาคตะวันออก 64.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 30) และภาคใต้ฝั่งตะวันออก 33.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 13) เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 81.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 22)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น


2. แมตโม (2521) หมายถึง ฝนที่ตกหนัก เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ตั้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนตุลาคม 2568




รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคกลางบางพื้นที่และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึก อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568


ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลทุนนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนตุลาคม 2568


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน ฝนตก (วัน)	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	ปริมาณน้ำ ระเหย (มม./วัน)
				เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย		
เหนือ	เชียงใหม่	173.0	10	25.9	31.3	20.7	81.3	4.0
	ลำปาง	66.0	13	25.9	31.3	22.4	85.0	3.7
	น่าน	60.5	6	27.2	32.9	22.9	81.0	4.0
	ศรีสะเกษ	202.5	14	28.3	33.3	24.9	82.7	3.6
	ดอยมูเซอ	182.9	19	22.6	26.6	20.0	88.2	3.7
	พิจิตร	74.9	15	28.8	33.4	25.3	79.9	3.7
	เลย	129.6	13	26.0	32.3	22.5	86.5	2.7
	สกลนคร	34.8	3	26.9	32.6	22.9	78.5	3.7
	นครพนม	83.0	9	26.5	32.2	22.3	83.9	4.5
ตะวันออก	ท่าพระ	128.3	10	27.4	32.5	22.3	82.6	3.3
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	109.5	10	27.2	31.7	23.4	79.7	3.9
	อุบลราชธานี	112.1	16	26.7	32.1	22.5	81.2	3.5
	ศรีสะเกษ	97.8	11	27.4	31.7	24.3	78.7	3.8
	ปากช่อง	104.2	11	25.5	30.7	22.5	82.4	4.3
	สุรินทร์	97.6	15	26.9	31.9	23.2	82.5	2.9
กลาง	ตากฟ้า	69.6	16	27.8	32.7	23.1	83.0	4.2
	ชัยนาท	114.0	15	28.1	32.8	25.1	83.3	3.7
	อยุธยา	143.4	14	28.3	33.5	22.4	81.7	4.2
	ปทุมธานี	421.1	13	28.7	34.3	25.4	78.2	5.6
	ราชบุรี	212.6	19	27.6	32.2	25.0	84.6	3.1
	อุทุม	157.2	16	28.3	33.2	24.4	79.9	3.7
	กำแพงแสน	132.2	11	28.1	32.9	24.8	82.4	4.2
	บางนา	270.7	22	28.6	33.0	25.2	76.3	3.9
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	105.5	17	27.1	33.2	23.8	84.6	2.9
	ห้วยโป่ง	167.4	17	27.5	32.2	24.5	82.5	3.3
	พลั่ว	206.0	17	27.4	32.1	24.2	83.4	3.4
ใต้	หนองพลับ	215.7	16	27.0	31.8	23.6	85.3	3.2
	สวี	291.5	21	26.8	32.0	23.8	87.9	2.9
	สุราษฎร์ธานี	336.1	21	26.7	31.8	23.8	88.3	3.0
	นครศรีธรรมราช	286.0	26	27.1	32.0	24.2	88.8	3.1
	พัทลุง	254.1	24	27.2	32.2	24.6	86.4	3.3
	คลองส	275.9	21	27.4	32.2	24.2	83.1	3.4
	ยะลา	326.1	20	27.0	32.9	23.7	84.1	3.7
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนตุลาคม 2568




รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนตุลาคม 2568




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิจেলা เดือนตุลาคม 2568




รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568



รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568



รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนตุลาคม 2568



รูปที่ 11 แผนที่แสดงความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนตุลาคม 2568

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนตุลาคม 2568

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2568 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 45,453,984 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,162 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 366 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.3 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 230 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.4 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 240 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
- 1.5 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 376 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.6 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 191 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.7 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,192 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.8 โรคขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 349 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.9 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 22 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.10 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 43 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.11 แมลงบั่ว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 85 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 55 จังหวัด จำนวน 8,630,104 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,233 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.2 โรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 3,241 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,046 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 2,718 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,190,298 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 301 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-8 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,921,521 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 22,404 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,401 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยทุกช่วงอายุการปลูก

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 264 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4-9 เดือน

3.4 ตัวหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 167 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 51 จังหวัด จำนวน 1,784,055 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

4.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 3,332 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

4.2 โรคใบไหม้แผลใหญ่ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 100 ไร่ ส่วนใหญ่

พบการระบาดในระยะออกดอกไหมถึงเก็บเกี่ยว

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 508,976 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม

การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 295 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 1,039,644 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 37,246 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,510 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ดั้วแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,028 ไร่

6.4 ดั้ววงว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 676 ไร่

6.5 ไรสีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 645 ไร่

7. ศัตรูปลาน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปลาน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,318,154 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

7.1 ดั้วแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,088 ไร่

7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,667 ไร่

7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 839 ไร่

7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 974 ไร่

7.5 ดั้วกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 484 ไร่

7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 102 ไร่

7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 4,929 ไร่

7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 788 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,509,953 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,133 ไร่

8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 2,751 ไร่

8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 355,064 ไร่

8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 6,668 ไร่

8.5 โรคเส้นดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 140 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 58 จังหวัด จำนวน 100,540 ไร่ พบการระบาดของหนอนกาแฟสีแดง

มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 8 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,348,765 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 352 ไร่

10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 864 ไร่

10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,697 ไร่

10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,287 ไร่

10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 239 ไร่

- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,023 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 75 ไร่
- 10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 511 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 784 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 127 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 206 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,463 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 516 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 139 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 19 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 374 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 452 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 428 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,361 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 81 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 282 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 191 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 25 ไร่
- 11.5 ไรก้ามห้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 38 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 41 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 14 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 65 จังหวัด จำนวน 304,859 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 203 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 506 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 355 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 266 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 583 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 140,707 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 291 ไร่

13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 274 ไร่

13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 141 ไร่

13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 187 ไร่

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์