



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

ธันวาคม 2568

Agrometeorological Report

December 2025

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๑-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-01-2026

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร
ธันวาคม 2568

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา
กรมอตุณียมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

มกราคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนธันวาคม 2568	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนธันวาคม 2568	4
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนธันวาคม 2568	15
4. แหล่งข้อมูล	19

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2568	7
---	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568	4
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568	5
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568	6
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนธันวาคม 2568	8
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนธันวาคม 2568	9
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568	10
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568	11
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568	12
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนธันวาคม 2568	13
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนธันวาคม 2568

สภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนธันวาคมยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ส่วนกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นช่วง ๆ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ เย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบางพื้นที่ โดยบริเวณเทือกเขา ยอดดอย และยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีหมอก หนาในบางพื้นที่และมีน้ำค้างแข็งเป็นบางวัน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง

สำหรับสภาวะอากาศเดือนธันวาคมปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปเป็นระยะๆ และบริเวณประเทศไทยตอนบนแทบไม่มี รายงานฝนตก ยกเว้นในช่วงกลางเดือนมีรายงานฝนส่วนมากอยู่ในภาคเหนือ จากอิทธิพลของคลื่นกระแสลม ตะวันตกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในบางวัน ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพล จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง เกือบตลอดเดือน กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดเดือนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย ทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 41 ส่วนอุณหภูมิลดลงทั่วประเทศสูงกว่าปกติ 0.6 องศาเซลเซียส รายละเอียด ต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2568 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน เกือบตลอดช่วง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 4-6 ธันวาคม 2568 ทำให้ ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ในระยะต้นและปลายช่วง อุณหภูมิต่ำที่สุด 10.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2.2 องศาเซลเซียส ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 บริเวณ ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ในวันที่ 4, 5 และ 10 ธันวาคม 2568 ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 15.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพล จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลางในระยะครึ่งหลัง ของช่วง กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างในระยะต้นช่วง ทำให้ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะกลางช่วง จากนั้นมีฝนเล็กน้อย บางแห่ง ส่วนทางตะวันตกของภาคมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในระยะกลางช่วง เว้นแต่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 89.4 มิลลิเมตร ที่ สถานีอากาศเกษตรศรี

จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

วันที่ 11-20 ธันวาคม 2568 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำที่สุด 12.5 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรเชิงทราย จังหวัดเชิงทราย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว และมีอากาศหนาวจัด ในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2.5 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สำหรับฝนในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาว ในวันที่ 13, 17 และ 18 ธันวาคม 2568 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะภาคเหนือมีฝนร้อยละ 35-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 54.9 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ส่วนภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค โดยมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทางตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 25-60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน กับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างในระยะต้นช่วง โดยปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 130.8 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568


วันที่ 21-31 ธันวาคม 2568 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและปลายช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วงที่อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวทั่วไปทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว ในขณะที่ภาคใต้มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง อุณหภูมิต่ำที่สุด 11.2 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำที่สุด 3.0 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 และที่ กัวแม่ปาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนแทบไม่มีรายงานฝนตก ส่วนภาคใต้ยังมีรายงานฝนตก โดยเฉพาะในระยะกลางช่วงมีฝนตกหนาแน่นร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาค ส่วนทางตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 154.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติทุกภาค อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส ที่ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 10.5 องศาเซลเซียส ที่อำเภอยะรัง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 6.0 มิลลิเมตร (57%) ภาคกลาง 5.3 มิลลิเมตร (67%) ภาคตะวันออก 7.2 มิลลิเมตร (73%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 97.9 มิลลิเมตร (37%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 52.0 มิลลิเมตร (57%) มีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 2.3 มิลลิเมตร (47%)


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนธันวาคม 2568




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568


ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนธันวาคม 2568




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนธันวาคม 2568




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิจนเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนธันวาคม 2568



รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนธันวาคม 2568

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนธันวาคม 2568

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2568 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 76 จังหวัด จำนวน 25,283,288 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 104 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 5 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 25 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.4 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 180 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
- 1.5 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 374 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.6 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 82 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.7 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 368 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.8 โรคขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 74 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.9 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.10 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 33 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 55 จังหวัด จำนวน 8,480,342 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 785 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน
- 2.2 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,470 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,473 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน

2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,951 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,062,003 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 301 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,932,120 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 21,083 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,350 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 264 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.4 ดั๋งหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 919 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 51 จังหวัด จำนวน 1,174,611 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด

ลายจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 76 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 506,891 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม

การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 288 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 1,017,736 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 30,119 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,145 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

6.3 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,202 ไร่

6.4 ดั๋งวง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 658 ไร่

6.5 ไรสีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 700 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,433,332 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 7.1 ตัวมอด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,135 ไร่
- 7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,684 ไร่
- 7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 863 ไร่
- 7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,117 ไร่
- 7.5 ตัวงูหลายา มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 411 ไร่
- 7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 103 ไร่
- 7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,875 ไร่
- 7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 622 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,591,688 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,153 ไร่
- 8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 3,167 ไร่
- 8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 833,819 ไร่
- 8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,661 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 59 จังหวัด จำนวน 115,998 ไร่ พบการระบาดของดังนี้

- 9.1 หนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 8 ไร่
- 9.2 มอดเจาะผลกาแฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 387 ไร่
- 9.3 หนอนเจาะกิ่ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 312 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,378,512 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 285 ไร่
- 10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 958 ไร่
- 10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,736 ไร่
- 10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 970 ไร่
- 10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 292 ไร่
- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 757 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 68 ไร่
- 10.8 โรคใบดิดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,311 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 739 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 126 ไร่

- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 188 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,419 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 514 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 125 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 295 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นโดยพบการระบาด 526 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 478 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,942 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 97 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 280 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 199 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 26 ไร่
- 11.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 29 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 42 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 13 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 305,231 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 188 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 602 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 355 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 245 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 594 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 143,481 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 240 ไร่
 - 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 252 ไร่
 - 13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 95 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 178 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์