



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

พฤษภาคม 2569

Agrometeorological Report

May 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๖-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-06-2026

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร
พฤษภาคม 2569

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา
กรมอตุณียมวิทยา
กระทรวงดิจิทัตเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

มิถุนายน 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนพฤษภาคม 2569	5
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนพฤษภาคม 2569	16
4. แหล่งข้อมูล	21

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2569	8
---	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569	5
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569	6
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569	7
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนพฤษภาคม 2569	9
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนพฤษภาคม 2569	10
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569	11
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569	12
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569	13
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนพฤษภาคม 2569	14
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569	15

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนพฤษภาคม 2569

สภาวะอากาศทั่วไปเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่เป็นบางวัน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น

สำหรับสภาวะอากาศเดือนพฤษภาคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนในช่วงต้นเดือน โดยหลายพื้นที่ของภาคเหนือ รวมถึงบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนจัดในบางวัน ในช่วงดังกล่าวบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกบางแห่ง จากนั้นในช่วงกลางเดือนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันในบางวัน และบางช่วงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและเริ่มต้นฤดูฝนของปีนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ส่วนในช่วงปลายเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเป็นระยะๆ กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในบางพื้นที่ ในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 21 และบางสถานีมีปริมาณฝนรวมตลอดทั้งเดือนสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้ของเดือนพฤษภาคม รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2569 : หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางวัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ รวมถึงบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด 42.1 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 สำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะกลางและปลายช่วง จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะกลางและปลายช่วง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ส่วนมากในระยะกลางและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 114.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 นอกจากนี้ยังมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยา สุโขทัย อุบลราชธานี สระบุรี

ระยอง และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ อุดรธานี สระบุรี และอุทัยธานี เมื่อวันที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร เมื่อวันที่ 3 จังหวัดแพร่ น่าน พิชณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นครปฐม และจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุดรธานี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร บึงกาฬ ชัยภูมิ สระบุรี และนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 และจังหวัดตาก สระบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี จันทบุรี และระยอง เมื่อวันที่ 10 กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 จังหวัดนครราชสีมาและอุทัยธานี เมื่อวันที่ 8 จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กับมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 40-85 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 119.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4

วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2569 : บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง และปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในระยะกลางช่วง และพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและประเทศไทยในตอนปลายช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ในวันที่ 17 พ.ค. อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว โดยภาคเหนือมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 146.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 20 นอกจากนี้ยังมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี และมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม นครสวรรค์ และสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยโสธร เมื่อวันที่ 18 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลำปางและลำพูน เมื่อวันที่ 12 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 และจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ และเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 18 และ 19 จังหวัดอุดรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 อีกทั้งมีรายงานน้ำท่วมบริเวณ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 138.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 20 นอกจากนี้ยังมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 18 จังหวัดกระบี่และพังงา เมื่อวันที่ 19 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 และมีรายงาน น้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 และจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18-20

วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะปลายช่วง โดยมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในระยะปลายช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 175.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัด ลำปาง เมื่อวันที่ 21 จังหวัดหนองบัวลำภูและร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น และอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 30 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และลำปาง เมื่อวันที่ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลำปาง เมื่อวันที่ 28 อีกทั้งมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 30 และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 และมีรายงานน้ำท่วม ฉับพลันบริเวณจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 197.2 มิลลิเมตร ที่ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 นอกจากนี้มีรายงาน ลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 และน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24


อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย อุณหภูมิสูงที่สุด 42.1 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 อุณหภูมิต่ำที่สุด 19.0 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัด ตาก เมื่อวันที่ 3

ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 44.3 มิลลิเมตร (26%) ภาคกลาง 5.3 มิลลิเมตร (3%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 32.9 มิลลิเมตร (25%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 271.9 มิลลิเมตร (90%)

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 5.4 มิลลิเมตร (3%) และ 34.0 มิลลิเมตร (17%) ตามลำดับ


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนพฤษภาคม 2569




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่ พื้นที่ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569


ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2569


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงราย	133.7	20	27.0	33.1	22.9	82.9	4.2
	ลำปาง	258.5	19	28.2	34.6	24.3	75.0	5.9
	น่าน	328.0	15	27.9	34.5	23.8	77.1	4.1
	ศรีลำโพง	207.9	15	29.3	35.9	25.2	74.1	5.2
	ดอยมูเซอ	350.2	26	23.7	28.4	20.7	83.8	3.5
	พิจิตร	141.3	15	29.8	35.8	25.4	79.2	5.2
	เลย	259.0	20	27.7	34.4	24.2	86.0	4.4
	สกลนคร	174.8	17	29.2	35.6	24.8	81.0	4.8
	นครพนม	296.5	16	28.8	34.7	24.3	85.5	4.3
ตะวันออก	ท่าพระ	131.8	8	29.1	35.5	24.5	78.6	5.1
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	80.6	14	29.3	35.0	25.4	78.9	5.2
	อุบลราชธานี	173.7	15	29.6	36.3	24.5	76.4	4.7
	ศรีสะเกษ	175.0	14	29.8	35.6	25.9	75.9	4.9
	ปากช่อง	247.6	19	27.2	33.1	23.7	81.4	5.2
	สุรินทร์	54.9	14	29.2	35.8	25.1	82.1	4.3
กลาง	ตากฟ้า	98.2	13	30.0	35.9	24.4	76.8	5.9
	ชัยนาท	139.4	13	29.6	35.5	25.7	78.1	5.6
	อยุธยา	124.3	13	30.0	36.2	26.2	82.3	5.1
	ปทุมธานี	104.4	18	30.8	37.0	26.7	70.8	5.5
	ราชบุรี	125.3	16	30.3	36.8	26.2	72.5	6.3
	อุทัย	41.4	9	30.5	36.7	26.2	73.8	6.0
	กำแพงเพชร	89.1	14	30.5	36.6	26.0	76.4	5.5
	บางนา	174.0	18	31.0	36.0	27.0	66.3	5.4
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	173.8	17	28.6	35.7	25.0	83.4	4.4
	ห้วยโป่ง	172.1	16	29.2	33.8	25.7	81.5	4.3
	พลับ	284.0	23	28.7	34.0	25.6	87.7	4.7
ใต้	หนองพลับ	83.6	11	29.1	35.6	25.0	74.7	5.1
	สวี	144.1	23	28.8	34.6	25.5	86.1	3.4
	สุราษฎร์ธานี	97.8	18	28.6	35.2	24.7	79.7	4.3
	นครศรีธรรมราช	245.2	18	28.0	33.9	24.7	86.4	3.5
	พัทลุง	133.7	17	28.9	34.4	25.5	85.0	4.0
	คอหงส์	184.0	11	28.8	34.3	25.0	76.8	4.3
	ยะลา	226.9	16	28.5	35.6	24.2	82.2	4.7
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนพฤษภาคม 2569




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนพฤษภาคม 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุนทภูมิเณลีย เดือนพฤษภาคม 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนพฤษภาคม 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงการเพิ่มขึ้นของไข้เลือดออกในประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2569

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนพฤษภาคม 2569

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2569 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 74 จังหวัด จำนวน 23,507,101 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 61 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 64 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 3 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.4 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 18 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.5 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 348 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.6 โรคขอบใบแห้งข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.7 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.8 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 54 จังหวัด จำนวน 6,988,740 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 5,785 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน
- 2.2 โรคเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 37,529 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 10,781 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 358 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 607,941 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 6-8 เดือน

2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 292 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.7 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 547 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,577,511 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 16,193 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,193 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 259 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.4 ดั้วหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 36 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

3.5 โรคใบด่างอ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 246 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 52 จังหวัด จำนวน 1,076,050 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 143 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาด

แบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 47 จังหวัด จำนวน 484,857 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม

การระบาดลดลง โดยพบการระบาด 224 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 70 จังหวัด จำนวน 1,025,310 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 27,240 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,776 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ดั้วแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,344 ไร่

6.4 ดั้วงวง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 708 ไร่

6.5 ไร่สีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,068 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,443,080 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

7.1 ดั้วงแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,560 ไร่

7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 11,266 ไร่

7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 721 ไร่

7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,048 ไร่

7.5 ดั้วงกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 368 ไร่

7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 121 ไร่

7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,235 ไร่

7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 363 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,538,891 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,413 ไร่

8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,401 ไร่

8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 978,465 ไร่

8.4 โรคหนำียงแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 6,044 ไร่

8.5 โรคใบจุดนูน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,790 ไร่

8.6 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 147 ไร่

8.7 โรคอาการเปลือกแห้ง/อาการหนำียงแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 5,207 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 34 จังหวัด จำนวน 113,814 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

9.1 มอดเจาะผลกาแฟ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 523 ไร่

9.2 หนอนเจาะกิ่ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 163 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,378,512 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 394 ไร่

10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,471 ไร่

10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,271 ไร่

10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,194 ไร่

10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 414 ไร่

- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 977 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 76 ไร่
- 10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 549 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,458 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 140 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 175 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,363 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 106 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 156 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 11 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 230 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 466 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 494 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,942 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 515 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 632 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 365 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 28 ไร่
- 11.5 ไรก้ามหยาบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 32 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 45 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 305,230 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 363 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 613 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 340 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 251 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 538 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 143,481 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 247 ไร่
- 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 215 ไร่

13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 105 ไร่

13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 171 ไร่

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์