



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

มกราคม 2569

Agrometeorological Report

January 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๒-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-02-2026

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร
มกราคม 2569

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา
กรมอตุณียมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนมกราคม 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมกราคม 2569	4
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมกราคม 2569	15
4. แหล่งข้อมูล	19

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมกราคม 2569	7
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569	4
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569	5
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569	6
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมกราคม 2569	8
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมกราคม 2569	9
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569	10
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569	11
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569	12
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมกราคม 2569	13
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมกราคม 2569	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนมกราคม 2569

สภาวะอากาศทั่วไปเดือนมกราคมอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ และมีกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนเป็นบางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นบางครั้ง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณเทือกเขา ยอดดอย และยอดภู อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเป็นบางวัน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ

สำหรับสภาวะอากาศเดือนมกราคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวเกือบตลอดเดือน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค โดยเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆ เกือบตลอดเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 8-12 มกราคม บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนแทบไม่มีรายงานฝนตก มีเพียงฝนบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค โดยเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 80 รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 มกราคม 2569 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ตลอดช่วง โดยมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 6-8 ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวทั่วไประดับอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง เช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในตอนปลายช่วง รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศหนาวบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำที่สุด 6.9 องศาเซลเซียส ที่ กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม อำเภอมือ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 9 สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำที่สุด 0.0 องศาเซลเซียส ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 และมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณจังหวัด

เชียงใหม่ตลอดช่วง สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่มีรายงานฝนตก ในขณะที่ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาคเกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 6-8 มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 171.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอสะทึงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6

วันที่ 11-20 มกราคม 2569 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในตอนปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อน นอกจากนี้ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในช่วงวันที่ 15-17 ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในระยะปลายช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวทั่วไปในระยะต้นช่วง จากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวบริเวณตอนบนของภาคเหนือรวมถึงบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำที่สุด 7.3 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12 สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำที่สุด 2.0 องศาเซลเซียส ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 และ 20 และมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 และวันที่ 17-18 และบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 11 ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงานฝนตก ภาคกลางมีฝนบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในตอนปลายช่วง เช่นเดียวกับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะปลายช่วง สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะต้นช่วง โดยมีฝนกับฝนตกหนักบางพื้นที่ในบางวัน ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 80.3 มิลลิเมตร ที่อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15

วันที่ 21-31 มกราคม 2569 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงปกคลุมบริเวณประเทศไทย โดยแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในระยะกลางช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลง โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันตลอดช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะภาคเหนือมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศหนาวในหลายพื้นที่ ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำที่สุด 9.1 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำที่สุด 1.0 องศาเซลเซียส ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 และ 26 และมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เกือบตลอดช่วง สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่มีรายงานฝนตก มีเพียงฝนบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะต้นช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 13.2 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของภาค และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยในช่วงนี้ภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด


ปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลางและบางช่วงมีกำลังอ่อน โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในบางวัน ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 58.1 มิลลิเมตร ที่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 25

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอุณหภูมิ ต่ำกว่าค่าปกติ 0.8 และ 1.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ อุณหภูมิต่ำที่สุด 6.9 องศาเซลเซียส ที่ กลุ่มงานอากาศ เกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 9 และอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณเทือกเขาและยอดดอยวัดได้ 0.0 องศาเซลเซียส ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 อุณหภูมิสูงที่สุด 36.0 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 10.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 100) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 100) ภาคกลาง 8.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 79) ภาคตะวันออก 18.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 80) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 82.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 78) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33.8 มิลลิเมตร (ร้อยละ 67)


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมกราคม 2569




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569

ในวันที่ 10 มกราคม 2569 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคกลางบางพื้นที่และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569

ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคกลางบางพื้นที่และภาคใต้บางพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569


ในวันที่ 30 มกราคม 2569 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคกลางบางพื้นที่และภาคใต้บางพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมกราคม 2569


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงใหม่	0.0	0	20.0	28.5	13.1	75.6	2.9
	ลำปาง	0.0	0	20.7	29.2	13.8	74.3	3.2
	น่าน	0.0	0	20.8	29.8	13.7	78.0	3.8
	ศรีสะเกษ	0.0	0	23.3	31.0	17.7	73.7	3.2
	ดอยมูเซอ	0.0	0	17.0	24.2	11.2	77.6	3.0
	พิจิตร	0.0	0	24.5	31.4	18.6	70.8	3.6
ตะวันออก	เลย	0.0	0	20.1	29.9	13.4	74.9	2.9
	สกลนคร	0.0	0	20.9	30.3	13.7	68.9	4.1
	นครพนม	0.0	0	21.4	29.3	13.6	71.5	4.7
	ท่าพระ	0.0	0	22.2	30.6	14.6	70.3	3.7
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0.0	0	22.4	29.8	15.5	65.1	4.4
	อุบลราชธานี	0.0	0	23.2	32.2	15.5	63.9	4.4
	ศรีสะเกษ	0.0	0	23.5	30.7	17.4	64.3	4.2
	ปากช่อง	0.0	0	22.5	30.4	15.9	61.6	6.2
กลาง	สุรินทร์	0.0	0	22.7	31.0	15.9	68.7	3.5
	ตากฟ้า	0.0	0	25.3	32.0	16.9	54.5	5.7
	ชัยนาท	0.0	0	23.9	31.1	18.0	70.7	3.9
	อยุธยา	0.0	0	25.3	32.6	18.4	70.3	4.6
	ปทุมธานี	0.0	0	26.2	32.9	20.4	66.0	3.8
	ราชบุรี	0.0	0	24.7	31.6	18.7	66.3	4.4
	อุทัย	2.7	1	23.8	30.8	17.2	68.6	4.2
	กำแพงแสน	0.0	0	23.7	30.8	17.1	74.4	3.8
ตะวันออก	บางนา	0.0	0	26.5	32.2	21.8	60.7	4.2
	ละโว้	7.6	1	24.4	32.7	17.8	68.3	3.8
	ห้วยโป่ง	4.4	2	25.8	32.2	21.0	69.7	4.2
ใต้	พลี	46.9	3	25.4	32.2	19.6	72.7	4.7
	หนองพลับ	0.2	1	24.2	31.3	17.5	67.8	4.1
	สวี	7.4	5	25.1	31.1	20.8	80.4	3.4
	สุราษฎร์ธานี	28.6	8	25.6	31.2	21.2	82.6	3.3
	นครศรีธรรมราช	76.3	7	25.9	30.4	22.2	86.6	2.5
	พัทลุง	86.0	9	26.1	30.3	22.9	83.1	3.4
	คอหงส์	11.4	2	27.0	31.1	23.0	77.0	4.3
	ยะลา	10.1	4	26.3	32.4	21.4	78.0	4.5
	หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้							




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมกราคม 2569




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมกราคม 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมกราคม 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมกราคม 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมกราคม 2569

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมกราคม 2569

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2569 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 76 จังหวัด จำนวน 24,534,054 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,197 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 413 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 180 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
- 1.4 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 3 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.5 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 55 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 60 วัน
- 1.6 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 601 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.7 โรคขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 68 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.8 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.9 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 54 จังหวัด จำนวน 8,137,582 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,626 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน
- 2.2 โรคเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 36,385 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,121 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 6 เดือน

2.4 โรคโคเนาหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 228 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 928,904 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 6 เดือน

2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 291 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,590,215 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 18,099 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,386 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 265 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 9 เดือน

3.4 ดั้วหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 16 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 52 จังหวัด จำนวน 1,114,9041 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 100 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาด

แบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 509,760 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม

การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 283 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 1,018,506 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 29,594 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,437 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ดั้วแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,269 ไร่

6.4 ดั้วงวง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 665 ไร่

6.5 ไรสีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 767 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,434,362 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 7.1 ตัวงแสด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,019 ไร่
- 7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,608 ไร่
- 7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 968 ไร่
- 7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,077 ไร่
- 7.5 ตัวงกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 404 ไร่
- 7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 103 ไร่
- 7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,439 ไร่
- 7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 552 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,617,337 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,182 ไร่
- 8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 2,306 ไร่
- 8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,520,854 ไร่
- 8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 5,749 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 59 จังหวัด จำนวน 116,030 ไร่ พบการระบาดดังนี้

- 9.1 หนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 8 ไร่
- 9.2 มอดเจาะผลกาแฟ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 191 ไร่
- 9.3 หนอนเจาะกิ่ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 157 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,378,511 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 302 ไร่
- 10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,296 ไร่
- 10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,953 ไร่
- 10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,170 ไร่
- 10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 377 ไร่
- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 691 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 64 ไร่
- 10.8 โรคใบดิดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,035 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,310 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 123 ไร่

- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 189 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,317 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 106 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 156 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 12 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 278 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 506 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 497 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,942 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 103 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 291 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 221 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 27 ไร่
- 11.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 28 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 43 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 13 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 305,231 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 298 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 623 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 341 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 240 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 572 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 143,481 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 244 ไร่
 - 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 242 ไร่
 - 13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 83 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 186 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์