



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

มิถุนายน 2569

Agrometeorological Report

June 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๗-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-07-2026

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร

มิถุนายน 2569

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา

กรมอตุณียมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

กรกฎาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมิถุนายน 2569	3
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมิถุนายน 2569	14
4. แหล่งข้อมูล	18

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2569	6
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569	3
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมิถุนายน 2569	7
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมิถุนายน 2569	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมิถุนายน 2569	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569	13

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนมิถุนายน 2569

สภาวะอากาศทั่วไปในระยะครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง และร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนลดลง

สำหรับสภาวะอากาศเดือนมิถุนายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเกือบตลอดเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตลอดเดือน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเป็นช่วงๆ โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 8 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค 0.4 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 มิถุนายน 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดช่วง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันแรกของช่วง กับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในระยะปลายช่วง นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนในระยะกลางช่วง ทำให้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 4, 5 และ 10 มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 และ 10 มีฝนร้อยละ 65-85 ของพื้นที่ ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนและบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาค ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 150.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2 และ ที่ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำพูน พะเยา อุดรธานี สุรินทร์ ตรวด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนาแน่น โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 138.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอ กระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4

วันที่ 11-20 มิถุนายน 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางตลอดช่วง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในระยะต้นช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 35-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาคตะวันออก ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 347.0 มิลลิเมตร ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 11 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กับมีน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 168.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11 กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 จังหวัดกระบี่และพังงา เมื่อวันที่ 10 และ 11


วันที่ 21-30 มิถุนายน 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายช่วง ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบน โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในภาคกลางมีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในวันที่ 21 และ 28 ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 111.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์และอุทัยธานี เมื่อวันที่ 25 จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 28 และ 30 มีฝนร้อยละ 65-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 138.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าปกติ อุณหภูมิสูงสุด 39.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 อุณหภูมิต่ำที่สุด 21.0 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 19.0 มิลลิเมตร (12%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 61.9 มิลลิเมตร (32%) ภาคกลาง 16.8 มิลลิเมตร (11%) และภาคตะวันออก 64.4 มิลลิเมตร(25%) ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 5.2 มิลลิเมตร (4%) และ142.9 มิลลิเมตร (43%) ตามลำดับ


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมิถุนายน 2569




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ พื้นที่ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จากการพิจารณาดรรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่


ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2569

ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงราย	36.7	14	27.7	33.6	23.7	79.1	4.6
	ลำปาง	93.1	21	28.0	33.5	24.3	76.0	4.0
	น่าน	206.0	12	27.5	33.3	24.0	79.3	4.3
	ศรีลำโพง	60.8	12	28.9	34.4	25.2	73.4	4.9
	ดอยมูเซอร์	241.5	26	22.7	26.6	20.8	88.1	3.0
	พิจิตร	111.3	13	29.9	35.4	26.1	81.1	5.6
	เลย	97.6	12	28.6	35.1	24.4	83.6	4.2
	สกลนคร	131.1	15	29.8	36.1	25.8	80.0	4.7
	นครพนม	161.4	20	28.6	33.9	25.0	89.3	4.2
ตะวันออก	ท่าพระ	111.5	11	29.4	35.7	25.1	76.3	4.9
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	162.8	12	29.8	35.4	25.8	77.1	6.2
	อุบลราชธานี	169.0	9	29.3	35.4	24.6	77.1	4.8
	ศรีสะเกษ	83.9	15	30.1	35.5	26.2	73.2	5.2
	ปากช่อง	64.2	12	27.6	32.3	23.9	76.7	6.6
	สุรินทร์	53.8	15	29.2	36.0	25.0	82.3	5.1
กลาง	ตากฟ้า	199.8	14	29.2	34.8	23.8	81.9	5.9
	ชัยนาท	108.3	13	29.1	34.6	25.6	78.7	5.3
	อยุธยา	113.4	14	29.7	35.4	26.0	84.1	5.2
	ปทุมธานี	212.1	21	30.1	35.7	26.5	75.2	5.8
	ราชบุรี	120.3	14	29.5	35.8	25.9	75.8	5.3
	อุทัย	59.2	12	29.9	35.7	26.0	75.2	5.8
	กำแพงแสน	79.4	19	29.7	35.5	25.8	79.3	4.9
	บางนา	216.3	20	30.5	35.6	27.1	67.1	5.2
ตะวันออก	ละโว้	207.6	21	28.5	35.1	24.8	83.2	4.6
	ห้วยโป่ง	139.9	18	28.8	33.5	25.7	82.7	4.6
	พลั่ว	612.0	27	28.4	33.4	25.2	89.6	2.8
ใต้	หนองพลับ	131.9	19	28.0	34.4	24.3	79.9	4.3
	สวี	153.4	15	28.8	35.1	25.4	85.3	3.7
	สุราษฎร์ธานี	162.3	12	28.5	34.5	24.6	79.8	4.2
	นครศรีธรรมราช	153.4	16	28.1	34.4	24.8	84.7	4.2
	พัทลุง	119.3	15	28.6	34.2	25.2	85.2	4.0
	คอหงส์	250.0	16	28.3	33.9	24.8	78.6	4.4
	ยะลา	139.2	17	28.4	35.1	24.5	82.1	4.6


หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมิถุนายน 2569




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมิถุนายน 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุนทภูมิเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมิถุนายน 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงการเพิ่มขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2569

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมิถุนายน 2569

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2569 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 74 จังหวัด จำนวน 33,079,907 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 57 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 526 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.3 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 3 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.4 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 18 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.5 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 364 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.6 โรคขอบใบแห้งข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.7 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.8 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 38 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 54 จังหวัด จำนวน 7,492,416 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 4,515 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน
- 2.2 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 22,737 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 9,949 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 445 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 662,466 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.6 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 557 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 46 จังหวัด จำนวน 4,833,230 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 16,612 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,193 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 212 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.4 ดั๋งหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 46 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.5 โรคใบด่างอ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 246 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 57 จังหวัด จำนวน 1,210,356 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 148 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาด
แบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 498,141 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม
การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 221 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 70 จังหวัด จำนวน 1,025,287 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 26,722 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,645 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,216 ไร่

6.4 ดั๋งวงง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 707 ไร่

6.5 ไรสีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,076 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,442,036 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 7.1 ตัวงแสด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,428 ไร่
- 7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,207 ไร่
- 7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 647 ไร่
- 7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,057 ไร่
- 7.5 ตัวงกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 354 ไร่
- 7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 124 ไร่
- 7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,339 ไร่
- 7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 332 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,461,520 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,362 ไร่
- 8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,406 ไร่
- 8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 980,996 ไร่
- 8.4 โรคใบจุดหนูน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,790 ไร่
- 8.5 โรคอาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 5,150 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 34 จังหวัด จำนวน 113,81 ไร่ พบการระบาดของดังนี้

- 9.1 มอดเจาะผลกาแฟ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 506 ไร่
- 9.2 หนอนเจาะกิ่ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 161 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,378,512 ไร่ พบการระบาดของ ดังนี้

- 10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 394 ไร่
- 10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,471 ไร่
- 10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,271 ไร่
- 10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,194 ไร่
- 10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 414 ไร่
- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 977 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 76 ไร่
- 10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 549 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,458 ไร่

- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 140 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 175 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,363 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 106 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 156 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 11 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 230 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 466 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 494 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,942 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 515 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 632 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 365 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 28 ไร่
- 11.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 32 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 45 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 305,230 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 363 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 613 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 340 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 251 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 538 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 143,481 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 247 ไร่
 - 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 215 ไร่
 - 13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 105 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 171 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์