



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

เมษายน 2569

Agrometeorological Report

April 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๕-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-05-2026

รายงานอตุณิยมวิทยาเกษตร
เมษายน 2569

ส่วนอตุณิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณิยมวิทยา
กรมอตุณิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

พฤษภาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนเมษายน 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนเมษายน 2569	3
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนเมษายน 2569	14
4. แหล่งข้อมูล	19

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนเมษายน 2569	6
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569	3
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนเมษายน 2569	7
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนเมษายน 2569	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนเมษายน 2569	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2569	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2569	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนเมษายน 2569	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนเมษายน 2569	13

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนเมษายน 2569

สภาวะอากาศทั่วไปเดือนเมษายนอยู่ในช่วงฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน รวมทั้งคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนเป็นบางครั้ง โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

สำหรับสภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันเกือบตลอดเดือน ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติทุกภาค สำหรับฝนในเดือนนี้ได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดเดือน นอกจากนี้ในระยะครึ่งหลังของเดือนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกับมีรายงานลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดเดือน ทำให้มีฝนตกเกือบตลอดเดือน โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 45.9 มิลลิเมตร (ร้อยละ 51) รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 เมษายน 2569 : หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วงที่มีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเกือบทั่วไป อุณหภูมิสูงสุด 42.2 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอดงเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 ที่ อำเภอดงเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 และที่ อำเภอดงเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดช่วง ทำให้มีฝนบางพื้นที่ ในบางวัน ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 44.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอดงเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 103.6 มิลลิเมตร ที่ อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9

วันที่ 11-20 เมษายน 2569 : หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในระยะกลางและปลายช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอดงเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ส่วนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในระยะต้นและกลางช่วง เว้นแต่ในวันที่ 19 มีฝนร้อยละ

80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบน วัดได้ 97.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 19 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย นครพนม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 116.2 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17


วันที่ 21-30 เมษายน 2569 : หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นช่วงๆ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 26-28 ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง เว้นแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิลดลงในระยะครึ่งหลังของช่วง แต่ยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนล่างของภาคกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 42.2 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 โดยมีฝัณร้อยละ 5-60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-75 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 191.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณจังหวัดตาก ลำพูน พิจิตร เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้มีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เมื่อวันที่ 24 กับน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 ส่วนภาคใต้มีฝัณน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 27-29 มีฝัณร้อยละ 50-85 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางฝั่งตะวันตกของภาค จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันตลอดช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 70.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29

อุณหภูมิเฉลี่ยเดิอนนี้สูงกว่าค่าปกติทุกภาค โดยอุณหภูมิต่ำที่สุด 16.2 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17

ปริมาณฝนเดิอนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 41.5 มิลลิเมตร (59%) ภาคกลาง 62.4 มิลลิเมตร (80%) ภาคตะวันออกเฉียง 69.9 มิลลิเมตร (69%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 63.2 มิลลิเมตร (79%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 98.8 มิลลิเมตร (61%) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 6.8 มิลลิเมตร (8%)


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนเมษายน 2569




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569

ในวันที่ 10 เมษายน 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่ พื้นที่ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ในวันที่ 20 เมษายน 2569 จากการพิจารณาดรรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569


ในวันที่ 30 เมษายน 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนเมษายน 2569


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงราย	40.3	6	27.8	36.2	21.1	65.8	4.5
	ลำปาง	62.1	3	30.2	38.7	23.2	55.1	6.1
	น่าน	76.0	4	29.8	38.1	22.9	64.3	4.5
	ศรีสะเกษ	12.2	2	31.6	38.6	25.7	59.3	5.2
	ดอยมูเซอ	19.3	2	25.2	32.1	19.5	62.8	6.0
	พิจิตร	5.3	1	31.5	38.8	25.4	62.0	5.7
	เลย	48.8	4	29.5	39.0	22.2	62.6	5.3
	สกลนคร	101.2	4	30.6	37.7	25.0	61.7	6.4
	นครพนม	113.6	8	29.8	37.4	24.0	70.1	4.7
ตะวันออก	ท่าพระ	141.7	6	31.4	38.4	24.1	59.5	6.5
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	55.3	7	31.2	38.0	25.2	59.7	7.0
	อุบลราชธานี	41.9	4	30.9	38.6	24.5	63.0	6.5
	ศรีสะเกษ	46.2	5	31.2	38.7	25.6	61.2	6.2
	ปากช่อง	55.2	8	29.5	36.2	23.3	61.8	8.3
	สุรินทร์	36.8	6	31.3	39.0	24.8	62.8	5.9
กลาง	ตากฟ้า	25.2	2	32.2	39.1	25.4	64.8	7.5
	ชัยนาท	28.0	2	31.6	38.2	26.2	67.4	7.0
	อยุธยา	123.1	2	31.9	39.2	26.7	71.6	7.0
	ปทุมธานี	38.1	5	32.4	39.1	27.0	62.2	6.9
	ราชบุรี	0.0	0	31.1	38.2	25.4	67.9	6.5
	อุทัย	0.5	1	31.8	38.7	25.7	62.8	7.0
	กำแพงแสน	0.0	0	31.7	38.6	26.0	68.7	6.3
	บางนา	0.0	0	31.7	36.4	27.9	69.2	6.5
ตะวันออก	ละโว้	132.9	9	30.0	38.1	25.1	73.5	5.8
	หัวไผ่	17.6	4	30.4	34.7	27.9	73.7	5.7
	พลับ	40.3	3	29.3	34.5	25.0	78.4	5.1
ใต้	หนองพลับ	0.0	1	30.6	38.7	23.4	63.4	7.0
	สวี	3.1	2	29.5	37.0	24.0	74.8	5.6
	สุราษฎร์ธานี	12.6	6	29.7	37.2	23.6	72.8	5.3
	นครศรีธรรมราช	6.3	1	29.5	36.2	24.3	80.6	4.7
	พัทลุง	19.5	2	29.6	35.2	25.3	77.7	5.4
	คลองเตย	63.6	1	29.8	36.2	24.8	71.0	5.7
	ยะลา	89.0	4	29.4	37.5	23.4	73.3	5.8




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนเมษายน 2569




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนเมษายน 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุนทภูมิเณลีย เดือนเมษายน 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2569



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนเมษายน 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนเมษายน 2569

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนเมษายน 2569

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2569 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 75 จังหวัด จำนวน 22,871,021 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 7,093 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 66 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 31 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 60 วัน
- 1.4 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 3 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.5 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 19 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.6 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,130 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.7 โรคขอบใบแห้งข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.8 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.9 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 54 จังหวัด จำนวน 6,807,824 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 3,716 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน
- 2.2 โรคเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 42,831 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 12,265 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

- 2.4 โรคโคเนน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 170 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 648,511 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 6-8 เดือน
- 2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 292 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.7 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 547 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,174,499 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 16,630 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน
- 3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการลดลง โดยพบการระบาด 1,190 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน
- 3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 155 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน
- 3.4 ดั๋งหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 16 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 53 จังหวัด จำนวน 1,077,702 ไร่ พบการระบาดของ หนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 200 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาด
แบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 500,671 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม
การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 244 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 70 จังหวัด จำนวน 1,018,474 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 27,893 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
- 6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,380 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
- 6.3 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,312 ไร่
- 6.4 ดั๋งวงง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 721 ไร่

6.5 ไร่สีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 928 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,443,060 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 7.1 ดั้วแรต มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,132 ไร่
- 7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 11,308 ไร่
- 7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 746 ไร่
- 7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,058 ไร่
- 7.5 ดั้วกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 346 ไร่
- 7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 115 ไร่
- 7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,085 ไร่
- 7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 431 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,627,882 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,637 ไร่
- 8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,051 ไร่
- 8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,123,940 ไร่
- 8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 6,044 ไร่
- 8.5 โรคใบจุดหนูน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,0790 ไร่
- 8.6 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 147 ไร่
- 8.7 โรคอาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,054 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 34 จังหวัด จำนวน 112,353 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 9.1 หนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 177 ไร่
- 9.2 มอดเจาะผลกาแฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 406 ไร่
- 9.3 หนอนเจาะกิ่ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 157 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,378,512 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 394 ไร่
- 10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,471 ไร่
- 10.3 โรคครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,271 ไร่
- 10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,194 ไร่
- 10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 414 ไร่

- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 977 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 76 ไร่
- 10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 549 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,458 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 140 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 175 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,363 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 106 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 156 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 11 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 230 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 466 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 494 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,209,942 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 515 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 632 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 365 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 28 ไร่
- 11.5 ไรก้ามห้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 32 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 45 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 305,231 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 363 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 613 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 340 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 251 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 538 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 143,481 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 247 ไร่
- 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 215 ไร่

13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 105 ไร่

13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 171 ไร่

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์